



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETTIT PUBLIK
TIRANË**

Rruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

**ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN
31 MARS – 6 PRILL 2008
(JAVA 14)**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre:

14 rrethe ose 39% (=14/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike dhe telefon:
BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, PËRMET,
POGRADEC, SHKODËR, TIRANË.

19 rrethe ose 53% (=19/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:
BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KRUIË, KOLONJË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH,
MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, M. MADHE, TEPELENË, VLORË, TROPOJË.

Pa raportim brenda afatit, 3 rreth ose 8% (=3/36) e tyre:
KUKËS, PUKË, SARANDË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 14-të

	JAVA 14
DIARRE PA GJAK	849
DIARRE ME GJAK	3
INF. RESP. TE SIPERME	6.703
INF. RESP. TE POSHTEME	4.535
RASH ME TEMPERATURE	4
VERDHEZA	3
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	350
% e Njësive Raportuese	83%(355/420)

Rash me temperaturë


Rastet me sindromin òrash me temperaturë nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

Verdhëz


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 14-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 13-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqitet i qëndrueshëm në javën e 14-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 13-të.

Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme në javët 01 – 14 të sezonit 2006 – 2007 dhe të sezonit 2007 – 2008. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas rretheve në javën e 13-të dhe javën e 14-të të vitit 2008. Incidenca (raste/10.000)



 Java e 13-të

 Java e 14-të

Nivelet e Raportimit për javën e 14-të sipas rretheve, në përqindje.



.....
.....