



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË**

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.
Tel: +355 4374756, Fax 355 43 70058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

**ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
25 SHKURT – 2 MARS 2008
(JAVA 9)**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=35/36) e tyre:

15 rrethe ose 41% (=15/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike dhe telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

19 rrethe ose 53% (=19/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KRUIË, KOLONJË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, M. MADHE, TEPELENË, VLORË, TROPOJË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

KUKËS, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 9-të

	JAVA 9
DIARRE PA GJAK	803
DIARRE ME GJAK	1
INF. RESP. TE SIPERME	8.690
INF. RESP. TE POSHTEME	6.178
RASH ME TEMPERATURE	4
VERDHEZA	2
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	4
Numri i Njësive Raportuese	356
% e Njësive Raportuese	85%(356/420)

Rash me temperaturë


Rastet me sindromin "rash me temperaturë" nuk janë suspekt fruth apo rubeolë.

Verdhëz


Rastet janë me natyrë sporadike, pa lidhje epidemiologjike me njera-tjetrën.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 9-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 8-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqitet i qëndrueshëm në javën e 9-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 8-të.


Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme në javët 45 – 09 të sezonit 2006 – 2007 dhe të sezonit 2007 – 2008. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas rretheve në javën e 8-të dhe javën e 9-të të vitit 2008. Incidenca (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 9-të sipas rretheve, në përqindje.



.....

.....