

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 43, 23 - 29 Tetor 2017

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORE.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 43

	JAVA 43
DIARRE PA GJAK	1.581
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	7.695
INF. RESP. TE POSHTËME	3.484
RASH ME TEMPERATURË	22
VERDHËZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	399
% e Njësive Raportuese	93% (399/427)

Rash me temperaturë

7 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit 5 raste nga rrethi i Vlorës, 3 raste nga rrethi i Tiranës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

7 raste janë raportuar nga rrethi i Pogradecit.

Hetim i rastit me Fruth, Pogradec

Aktualisht është duke u kryer hetimi i një rasti pozitiv për Fruth –nje femije i moshës 6 vjeç i komunitetit egjiptian, dhe i rasteve me “rash me temperaturë” në rrethin e Pogradecit.

Nga hetimi rezulton që rasti është i importuar nga Maqedonia. Gjithashtu po kryehet edhe vaksinimi i të gjithë fëmijeve të pavaksinuar të komunitetit Rom dhe Egjiptian në rreth.

Duke u nisur nga shpërthimet epidemike të Fruthit që po ndodhin në Kosove, Maqedoni , Greqi si dhe shtete të tjera te Europës dhe Ballkanit, theksojmë përforcimin e Survejancës së sindromit “rash makulopapular me temperaturë” dhe raportimin e këtij sindromi nga të gjithë mjekët. Po ashtu ritheksojmë se çdo rast me rash makulopapular dhe temperaturë duhet të vlerësohet në kuadër të Fruthit dhe Rubeolës.

Verdhëza


Rasti është i grupmoshës 45-59 vjeç dhe është raportuar nga rrethi i Kavajës. Më pas diagnoza rezultoi “Hepatit viral C”

Ethe të Pashpjegueshme


Rasti është i grupmoshës 60+ vjeç dhe është raportuar nga rrethi i Fierit. Më pas diagnoza rezultoi “Brucelozë”

Infeksione Respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 43 krahasuar me javën paraardhëse, java 42.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i “Diarre pa gjak” paraqet rënie në javën 43 krahasuar me javën paraardhëse, java 42.

Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 30 – 43 të vitit 2016 dhe të vitit 2017. Numri i rasteve.




Në javën e 43 të vitit 2017 vërehet një trend i qëndrueshëm i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është i njëjtë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën e 43 të vitit 2017. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)




Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 42 dhe 43 të vitit 2017. Incidenca (raste/10.000)




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 30 – 43 të vitit 2016 dhe të vitit 2017. Numri i rasteve.



Në javën e 43 të vitit 2017 vërehet një trend në rënie i numrit të rasteve të “Diarreve pa gjak” dhe ky numër është 2% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 42 dhe javën 43 të vitit 2017. Incidenca (raste/10.000)



Nga komunikimi me rrethet, shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nivelet e Raportimit për javën e 43 sipas rretheve, në përqindje.

