REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
"HULO HAJDËRI"

Instituti i Shëndetit Publik

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 48, 27 Nëntor – 3 Dhjetor 2017

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË,DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË,KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 48

	JAVA 48
DIARRE PA GJAK	1.146
DIARRE ME GJAK	1
INF. RESP. TE SIPËRME	6403
INF. RESP. TE POSHTËME	3.036
RASH ME TEMPERATURË	17
VERDHËZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	391
% e Njësive Raportuese	92% (391/427)

Rash me temperaturë

3 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit, 1 rast nga rrethi i Matit, 6 raste nga rrethi i Tiranës dhe 7 raste nga rrethi i Vlorës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rretheve rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Duke u nisur nga shpërthimet epidemike të Fruthit që po ndodhin në Kosovë, Maqedoni, Greqi si dhe shtete të tjera te Europës dhe Ballkanit, theksojmë përforcimin e Survejancës së sindromit "rash makulopapular me temperaturë" dhe raportimin e këtij sindromi nga të gjithë mjekët. Po ashtu ritheksojmë se çdo rast me rash makulopapular dhe temperaturë duhet të vlerësohet në kuadër të Fruthit dhe Rubeolës.

Tërhiqet vëmendje për survejancën aktive të "rash me temperaturë" në komunitetin rom si edhe në institucionet parashkollore dhe në shkolla si dhe identifikimi dhe vaksinimi i të pavaksinuarve në të gjithë rrethet.

Diarre me gjak

Rastet janë të grupmoshës 1-4 vjeçdhe 5 – 14 vjeç të raportuara nga rrethi i Kukësit pa lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre. Më pas ekzaminimi rezultoi pozitiv per *"Shigella"*.

Infeksione Respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve



Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave



Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 48 krahasuar me javën paraardhëse, java 47 edhe për shkak të nënraportimit me rastin e pushimeve të festave të Nëntorit.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve



Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave



Trendi në kohë i "Diarre pa gjak" paraqet rënie në javën 48 krahasuar me javën paraardhëse, java 47.

Trendi i "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" në javët 35 – 48 të vitit 2016 dhe të vitit 2017. Numri i rasteve.



Në javën e 48 të vitit 2017 vërehet një trend në rënie i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 7% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" sipas grupmoshës në javën e 48 të vitit 2017. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)



Krahasimi i aktivitetit të "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000



Frekuenca e hasjes së "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" sipas rretheve në javën 47 dhe 48 të vitit 2017. Incidenca (raste/10.000)



Trendi i "Diarreve pa Gjak" në javët 35 – 48 të vitit 2016 dhe të vitit 2017. Numri i rasteve.



Në javën e 48 të vitit 2017 vërehet një trend në rënie i numrit të rasteve të "Diarre pa gjak" dhe ky numër është 2% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së "Diarreve pa gjak" sipas rretheve në javën 47 dhe javën 48 të vitit 2017. Incidenca (raste/10.000)



Nga komunikimi me rrethet, shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nivelet e Raportimit për javën e 48 sipas rretheve, në përqindje.