

Udherrefyes Kombetar I Praktikes me te Mire Klinike Tonsilitin dhe Vegetacionin Adenoid

Data e publikimit: Dhjetor 2010

Data e rishikimit: Sipas nevojes

Grupi i punes :

Birkena Qirjazi	sekretar	QSUT
Narina Sulcebe	kryetar	QSUT
Besim Boci	anetar	QSUT
Esmeralda Bregu	anetar	QKCSA
Arian Bregu	anetar	MSH
Rudina Mazniku	anetar	ISKSH

Pasqyra e lendet

1. rendesia e problemit	3
2. objektivi i ketij udherrefyesi	3
3. perdoruesit e ketij udherrefyesi	3
4. popullata target	4
5. nderhyrja dhe te dhenat praktike	5
6. pasojat madhore ne konsiderate	5
7. rekomandimet	5
8. evidenca	10
9. metodat e perdorura per te analizuar te dhenat	11

Akronimet

ORL- Oto Rhino Laringologji

ASLO - Antikorp antistreptolizina O

UI – unite(njesi matese)

Falenderime

Falenderojme gjithe antaret e grupit te punes

Rendesia e problemit

Tonsiliti dhe vegetacioni adenoid jane nga problemet me te shpeshta qe hasen jo vetem ne praktiken ORL, por edhe ate te mjekut te familjes apo te atij pediater. Nisur nga shpeshtesa e ketyre problemeve dhe nga fakti qe mund te prekin cdo grupmoshe, diagnostikimi dhe trajtimi korrekt i tyre merr nje rendesi te vecante. Per me teper, indikacionet per trajtimin kirurgjikal te ketyre patologjive duhet te jene te mirepercaktuara dhe te unifikuara.

Objektivi i udherrefyesit

Objektivi kryesor eshte te ndihmoje klinicistet per te dhene disa orientime lidhur me :

- vleresimin dhe investigimin e tonsilitit dhe te hipertrofise adenoide, dhe
- mjekimin korrekt te tyre

Perdoruesit e ketij udherrefyesi jane;

- Mjeket e familjes
- Mjeket ORL
- Kirurget
- Pediatrit
- Internistet

Popullata target(shenje)

Femijet dhe te rriturit me dhimbje ftyi dhe tonsilit. Femije me veshtiresi ne frymemarrje.

Nderhyrjet dhe te dhenat praktike:

Diagnoza:

1. Te dhenat klinike, perfshire ekzaminimin fizik te faringut, palpacionin e qafes dhe egzaminimin e nazofaringut. Kerkimin per pranine e rasshit ose te fokuseve te tjere infektive.
2. Kultura e fytit per streptokok .

Trajtimi/parandalimi sekondar:

1. Antibiotikoterapi
 - o Penicillin V,Cephalexin ose Cefadroxil ne rastin e alergjise nga penicillina
 - o Cephalexin ose Cefadroxil si trajtim i linjes se pare ne infekzionet rekurrente; Clindamicin.
2. Analgjezik sic eshte Paracetamoli, Ibuprofeni ose spray Lidokaine.
3. Antibiotike per gonorrhene faringeale.
4. Drenim dhe antibiotike per abcesin peritonsillar.
5. Tonsillectomia.

Njohja dhe kontrolli i epidemise:

1. Kulture fytit per streptokok ne popullaten simptomatike dhe ate asimptomatike.
2. Trajtimi i menjehershëm i personave me kulture pozitive per streptokok.
3. Te merret ne konsiderate kultura e fytit dhe trajtimi per anetaret e familjes se personave simptomatike.

Pasojet madhore ne konsiderate

- Kohe-zgjatja e symptomave
- Incidenca e ethes reumatoide, glomerulonefritit, otit media dhe sinusitit
- Incidenca e otiteve akute dhe otiteve me efuzion
- Te dhenat klinike dhe bakteriologjike
- Efektet anesore
- Incidenca e infeksioneve rekurrente te fytit qe ndjekin tonsillektomine

Rekomandimet

Rekomandimet madhore

Te dhenat baze:

- Kultura e fytit merret ne pacientet me shenja te qarta per tonsillit, pa simptoma te tjera respiratore (qe tregojne zakonisht nje infeksione virale si psh rhinit, kolle, ngjirje zeri).
- Antibiotiket jane te indikuar ne infekzionet e shkaktuara nga streptokoku B-hemolitik i grupit A.
- Abcesi peritonsillar duhet diagnostikuar dhe trajtuar menjehere.
- Duhet identifikuar semundjet e meposhtme;
 - Mononukleoza
 - Gonorrhea faringeale
 - Tiroiditi subakut
 - Granulocitopenia (ne pacientet qe marrin barna qe frenojne palcen kockore)
- Duhet te identifikohet burimi i infekzionit ne tonsillitet rekurrente
- Duhet te njihen dhe kontrollohen epidemite (edhe ato qe shkaktohen nga Streptokoku i grupit C dhe G)

Etiologja e tonsillitit:

- Streptokoku i grupit A eshte shkaku i tonsillitit ne 5-20% te rasteve (gjate epidemive 40%). Prevalanca e tonsillitit eshte me e ulet gjate stines se veres.

- Lloje te tjere streptokoku mund te shkaktojne epidemi por nuk lene pasoja.
- Mononukleoza eshte diagnostikuar ne 1-2% te semureve me tonsillit.
- Arcanobacterium eshte agjent shkaktar ne me pak se 1% te rasteve. Paraqitja klinike ngjan me fruthin. Nuk indikohet terapia.
- Ne shumicen e rasteve dhimbja e fytit ka etiologji virale. Viruset mund te jepin temperature te larte, rash dhe exudat faringeal.

Grupet ne risk:

- Streptokoku:femijet mbi 3 vjec dhe adultet e rinj (15 deri 24 vjec)
- Mononukleoze: femijet dhe adultet e rinj
- Gonorrhea: personat seksualisht aktive

Egzaminimet:

- Ekzaminimi i faringut: edema peritonsillare, eksudat, trizmus.
- Palpimi i qafes
 - Prani e gjendrave limfatike te zmadhuara me lokalizime te tjera pervec kendit te nofuller; mononukleze
 - Gjendra tiroide e zmadhuar dhe e dhembshme; tiroiditis?
- Rash: virus, streptokok i grupit A, arcanobacterium.
- Ede me kapakeve te syve: mononucleosis?
- Fokuse te tjere infekzioni: sinuset, veshet, dhembet, trakti i poshtem respirator
- Kultura e fytit per streptokoke eshte ekzaminimi me i rendesishem ne percaktimin e shkaktarit mikrobial. Vleresimi klinik nuk eshte i sakte ne percaktimin e etiologjise mikrorobiale.
 - Kultura e fytit eshte metoda me e sakte dhe me pak e kushtueshme ne percaktimin e mikrobit dhe zgjedhjen e mjekimit.
 - Kultura e fytit gjithashtu zbulon streptokok te grupit jo-A (nuk ka inhibim te hemolizes perreth diskut me bacitracin)
 - Konfirmimi me kulture fytit nuk eshte i nevojshem ne personat nen 3 vjec, sepse tonsilliti i shkaktuar nga streptokoku eshte shume i rralle ne kete grup moshe.
- Analize e gjakut me formule dhe ASLO per te pare
- Nese nevojitet kerkohet test i shpejte per mononukleozën dhe kulture fytit per neisseria gonorrhea.
- Egzaminimi i nazafaringut per te pare hipertrofine e tonsiles nazofaringeale
- Audiometri tonale nese dyshohet per pranine efuzioneve te veshit te mesem
 - Audiometria tonale tek femijet ka vlere klinike vetem per ata mbi moshen 4.5 – 5 vjec

- Ne femije me te vegjel mund te perdoren metoda depistuese, audiometria me lodra ose metodat e tjera sipas moshes

Organizimi i trajtimit:

- Mjeku duhet te vizitoje te gjithe femijet dhe te rriturit qe kane nje nga ankesat e meposhtme, dhimbje te sinuseve paranazale ose te veshit, kolle me gelbase ose trizmus.
- Te semuret e rritur zakonisht duhet te ekzaminohen nga infermierja qe merr edhe kulturen e fytit
- Antibiotiket jane te indikuar ne infeksionet klinike nga :
 - Streptokoku i grupit A
 - Streptokoke te llojeve te ndryshme nese simptomat jane te renda, praktikisht gjate epidemive.
- Nese i semuri paraqitet me simptoma te renda, fillohet antibiotiku diten e pare nderkohe pritet per rezultatin e kultures se fytit. Nese kultura e fytit rezulton negative antibiotiku duhet te nderpritet.

Antibiotikoterapia ne semundjet e shkaktuara nga streptokoku

- Penicillin V 1.5 milion UI x 2 x 10 dite.
- Ne rastet e alergjise nga penicillina: Cephalexin orale 750 mg x 2 ose Cefadroxil 1g x 1(A)
- Antibiotikoterapia shkurton disi zgjatjen e simptomave (A) dhe redukton riskun e ethes reumatike (C).
- Ne mjekimin e simptomave, analgjeziku (paracetamol ose ibuprofen) (B) eshte me efektiv se antibiotiket. Ne te rriturit, dhimbja gjate gelltites mund te trajtohet me lidokaine spray ose gargare.
- Streptokoku jo-A; ne pacientet me simptoma te renda dhe gjate epidemive i nejti trajtim si per streptokokun e grupit A.
- Perseritja e kultures se fytit nuk eshte e nevojshme nese nuk rishfaqen simptomat.
- 1 dite pas trajtimit me antibiotike, pacienti nuk eshte me infektiv

Antibiotikoterapia ne shkaktaret e tjere mikrobike

- Gonorrhea faringeale zakonisht shkakton simptoma mesatare. Duhen trajtuar te dy partneret me antibiotike per semundje sexualisht te transmetueshme.
- Mononukleoza nuk duhet te trajtohet me antibiotike. Ampicillina duhet te evitohet (rash).

Abcesi peritonsillar

- Trizmus (veshtiresi dhe dhimbje ne hapjen e gojes).
- Veshtiresi ne gelltitje dhe shtim i salivacionit.
- Edeme perreth dhe siper tonsilles, devijim i uvules, asimetri dhe zhvendosje perpara e palatumit te bute.
- Trajtimi konsiston ne drenimin e abcesit (shpesh tonsillectomia e menje hershme) dhe perdomin e antibiotikeve.

Tonsilliti rekurent

- Dhimbje ftyi rekurrente me test pozitiv per streptokok te grupit A.
- Ne shumicen e rasteve ndodh ri-infekzion.
- Kultura e fytit duhet te merret tek pacienti dhe tek anetaret e tjere te familjes.
- Duhet te ndiqen patientet e tjere simptomatike ne vendin e punes.
- Ne infekzionet rekurrente trajtim i linjes se pare eshte cephalexin ose cefadroxil, e cila zhduk streptokokun e grupit A ne menyre me efikase se penicillin (**A**). Clindamycin (300 mg x 2 per 10 dite,) zhduk gjithashtu edhe streptokokun e grupit A, dhe parandalon tonsillitet rekurrente te shkaktuara nga bakterie te tjera

Indikacionet per tonsillektomi

- Tonsillit bakterial rekurrent i konfirmuar (me shume se 3 here ne vit), pavaresisht nga lloji i bakterit shkaktar (**C**).

- Ne referim dunet te perfshihen te dhenat dhe rezultatet e kulturave bakteriale.
- Tonsiliti kronik ose rekurrent, nga streptokoku, qe eshte rezistent ndaj mjekimit me antibiotike betalaktamaze -rezistente
- Komplikacionet e tonsillitit akut: abcesi peritonsillar, septicemia me origjine nga tonsilet.
- Abcesi peritonsillar trajtohet me tonsillektomi
- Dyshim per semundje malinje (verehet asimetri e dukshme ose ulceracione).
- Obstuksion i rrugeve ajrore te shkaktuara nga zmadhimi i tonsileve (te cilat pothuajse prekin njera- tjetren), apnea e gjumit, malokluzioni dentar.
- Tonsiliti kronik eshte nje indikacion per tonsillektomi. Operacioni eshte i indikuar ne ato paciente qe vuajne vazhdimesht me ere te keqe nga goja, dhembje ftyi dhe nxjerrje te tapave putride, dhe nese simptomat nuk pakesohen gjate ndjekjes.

Indikacionet per adenotomi

- 4 ose me shume episode rhinorrhe purulente rekurrente ne 12 muajt e fundit ne nje femije nen 12 vjec. Se paku nje episod i dokumentuar me ekzaminim intranasal ose imazheri.
- Simptoma persistuese te adenoiditit pas 2 mjekimesh me antibiotike. Nje prej ketyre mjekimeve duhet te jete me beta-laktamina per se paku 2 javе.
- Crrregullime te gjumit me obstruksion te rrugeve te siperme respiratore per se paku 3 muaj.
- E folur nazale
- Otit i mesem me efuzion mbi 3 muaj ose nevoja per te perseritur timpanostomine per here te dyte
- Otit i mesem me efuzion ne femije mbi 4 vjec
- Nderlikime kardiopulmonare, qe perfshijne cor pulmonale, hypertension pulmonar, hipertrofi ventrikulare te djathte, qe shoqerohen me obstruksion te rrugeve te siperme respiratore.

Epidemite nga Streptokoku

- Epidemia nga streptokoku duhet te dyshohet nese:

- ka disa paciente nga i njeji vend (lokalizim)
- i njeji pacient ka infeksione rekurente nga streptokoku.
- Epidemite zakonisht shfaqen ne institucionet e kujdesit ditor, institucionet e kujdesit ndaj moshave te treta, shkolla, njesite ushtarake.
- Nese epidemia eshte e rende, te konsiderohet mundesia e infektimit nga ushqimet.
- Personeli infermieror duhet te paraqitet ne vendin e epidemise dhe te marre material per kulture ftyi per streptokok ne personat simptomatik edhe ata jo simptomatike.
- Te gjithe personat me kulture ftyi pozitive duhet te trajtohen menjehere dhe te largohen nga shkolla, vendi i punes, etj per 1 dite pasi te filloje trajtimi, pavaresisht nese kane apo jo simptoma. Kontrolli i mostrave nuk eshte i nevojshem pas trajtimit.
- Gjithashtu duhet te merret kulture ftyi dhe te trajtohen anetaret e familjes se personave simptomatike.

Nje perfundim nga te dhenat shkencore:

Nje doze dexamethasoni parandalon te vjellat post operatore pas tonsillectomise, ne shumicen e femijeve (**B**).

Indikacione per monitorim ‘in patient’

Adenotonsilektomia eshte shpesh nje operacion qe nuk kerkon qendrim ne spital (outpatient). Rekomandohet qendrim ne spital per:

femije nen 3 vjec, histori te apnese obstruktive te gjumit, femije me probleme te tjera mjekesore, vonesa neurologjike, anomali kranio-faciale, femije qe jetojne larg spitalit (jashte rrerhit). Te semure te rritur, qe kryejne tonsillektomi per 15. underlikime te tonsiliteve, apo qe jane obese, me problem te apnese, duhet te qendrojne nje nate ne spital, po te jetojne jashte rrerhit, apo ne qytetet e medha 1 ore larg spitalit.

Evidencia

Finnish Medical Society Duodecim. Sore throat and tonsillitis. In: EBM Guidelines. Evidence-Based Medicine [Internet]. Helsinki, Finland: Wiley Interscience. John Wiley & Sons; 2007 Feb 2 [Various].

Niveli i evidences:

A. Kualiteti i Evidences: I larte

Ka pak te njare qe studimet e metejshme te ndryshojne besimin ne efektin e parashikuar

Ka disa studime te rendesishme, me nivel te larte, me perfundime te njejtë
Ne raste te vecanta studime ne disa qendra

B. Kualiteti i Evidences: I Moderuar

Ka te njare qe studimet e metejshme te kene ndikim ne besueshmerine e efektit te percaktuar dhe te mund ta ndryshojne ate.

Nje studim i rendesishem me nivel te larte

Disa studime por me disa kufizime

C. Kualiteti I Evidences: I Ulet

Ka shume te ngjare qe studimet e metejshme te kene nje ndikim te rendesishem ne besueshmerine dhe vleresimin e efekteve te pritura dhe ta ndryshojne ate.

Nje ose disa studime me kufizime te theksuara

D. Kualiteti I Evidences: Shume I Ulet

Cdo vleresim i efekteve eshte i pasigurt

Opinion i eksperteve

Nuk ka te dhena nga studime direkte

Nje ose disa studime me kufizime te theksuara

Metodat e perdorura per te analizuar te dhenat

Rishikim sistematik

Bibliografia:

Finnish Medical Society Duodecim

SIGN.Management of sore throat and indications for tonsillectomy.

(Scottish Intercollegiate Guidelines Network)

Sore throat and tonsillitis. In: EBM Guidelines. Evidence-Based Medicine [Internet].

Helsinki, Finland: Wiley Interscience.

John Wiley & Sons; 2007 Feb 2 [Various]