

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 02, 11 - 17 JANAR 2016

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJË, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEÇ, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 02

	JAVA 02
DIARRE PA GJAK	1.445
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	8.155
INF. RESP. TE POSHTËME	4.584
RASH ME TEMPERATURË	18
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	2
Numri i Njësive Raportuese	396
% e Njësive Raportuese	93% (394/427)


Rash me temperaturë

11 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit, 4 raste nga rrethi i Tiranës dhe 3 raste nga rrethi i Vlorës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.


Ethe e pashpjegueshme

Rastet janë të grupmoshës 15-44 vjeç dhe 45-59 vjeç të raportuara nga rrethi i Pogradecit. Më pas diagnoza rezultoi Suspekt “Brucelozë”.

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet 8% ritje në javën e 2-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 1-rë

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqet 3% rënie në javën e 2-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 1-rë

Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 35 – 02 të sezonit 2014-2015 dhe të sezonit 2015-2016. Numri i rasteve.




Në javën e 02 të vitit 2016 vërehet trend në rritje të numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 10% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 01 dhe 02 të vitit 2016. Incidenca (raste/10.000)




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 2-të të vitit 2015. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)



Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 35 – 02 të sezonit 2014-2015 dhe të sezonit 2015-2016. Numri i rasteve.



Në javën e 2-të të vitit 2016 vërehet një trend në rënie i numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është më i njëjtë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 01 dhe javën 02 të vitit 2016. Incidenca (raste/10.000)



Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve

Nivelet e Raportimit për javën e 02 sipas rretheve, në përqindje.

