

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 38, 14 SHTATOR – 20 SHTATOR 2015

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJË, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEÇ, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 38

	JAVA 38
DIARRE PA GJAK	2.242
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	5.413
INF. RESP. TE POSHTËME	2.597
RASH ME TEMPERATURË	1
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	2
Numri i Njësive Raportuese	400
% e Njësive Raportuese	93% (400/427)

Rash me temperaturë

Rasti janë raportuar nga rrethi i Tiranës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rasti nuk është suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Verdhëza


Rasit është i grupmoshës 5-14 vjeç i raportuar nga rrethi i Pogradecit.

Më pas diagnoza rezultoi: “Hepatit viral A”


Ethe të Pashpjegueshme

Rastet janë të grupmoshës 45-59 vjeç dhe 60+ vjeç të raportuar nga rrethi i Pogradecit. Më pas diagnoza u konfirmua “Brucelozë”

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet ritje në javën e 38 krahasuar me javën paraardhëse, java 37.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqet rënie në javën e 38 krahasuar me javën paraardhëse, java 37.

Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 38 të vitit 2014 dhe të vitit 2015. Numri i rasteve.




Në javën e 38 të vitit 2015 vërehet trend në ritje i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 15% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 37 dhe javën 38 të vitit 2015. Incidenca (raste/10.000)



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 38 të vitit 2015. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 38 të vitit 2014 dhe të vitit 2015. Numri i rasteve.




Në javën e 38 të vitit 2015 vërehet një trend në rënie i numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 9% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 37 dhe javën 38 të vitit 2015. Incidenca (raste/10.000)



Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas grupmoshës në javën 38 të vitit 2015. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)



Incidenca më e lartë se diarreve vërehet në grupmoshën pediatrike 0-14 vjeç.

Ne lidhje me situaten epidemiologjike vërehet ulje e numrit të rasteve me “Diarre” dhe rritje e numrit të rasteve me Infeksione respiratore të Diperme dhe të Poshteme. Gradualisht në javën e 40 hyjme në sezonin e Gripit të percaktuar nga OBSH dhe ECDC nga java 40 deri në javën 20 të vitit pasardhës.

Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Kontaktet me epidemiologët e rretheve janë të vazhdueshme për njoftimin në kohë në ISHP të çdo ngjarjeje shëndetësore të pazakonshme, në veçanti në zonat turistike.

Eshtë përforcuar survejanca laboratorike për marrjen e mostrave për çdo rast të dyshuar që mund të jetë shkak për një shpërthim me natyrë hidrike apo ushqimore dhe kryejnë e hetimit epidemiologjik për marrjen e masave të kontrollit dhe të parandalimit.

Në javën e 38 nuk kanë ndodhur shpërthime me origjinë ushqimore apo hidrike.

Nivelet e Raportimit për javën e 38 sipas rretheve, në përqindje.

