

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 23, 6 – 12 Qershor 2016

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, LUSHNJË, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEÇ, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 23

	JAVA 23
DIARRE PA GJAK	1.429
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TË SIPËRME	6.870
INF. RESP. TË POSHTËME	2.974
RASH ME TEMPERATURË	38
VERDHËZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	397
% e Njësive Raportuese	93% (397/427)

Rash me temperaturë

28 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit, 1 rast nga rrethi i Kavajës, 1 rast nga rrethi i Vlorës dhe 8 raste nga rrethi i Tiranës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Duke u nisur nga shpërthimet epidemike të Fruthit që po ndodhin në disa shtete të Europës dhe Ballkanit, në komunikimin me epidemiologët e rretheve është theksuar përforcimi i Survejancës së sindromit “rash makulopapular me temperaturë” nga mjekët Pediatër dhe Infeksionistë dhe marrja e mostrave të gjakut nga rastet e suspektuara.


Verdhëza

Rasti i grupmoshes 15-44 vjeç është raportuar nga rrethi i Fierit.


Më pas diagnoza rezultoi: “Hepatit viral B”

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i “Diarre pa gjak” paraqet 4% rënie në javën e 23 krahasuar me javën paraardhëse, java e 22

Infeksione Respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 23 krahasuar me javën paraardhëse, java e 22

Frekuenca e hasjes së “Diarre pa gjak” sipas grupmoshës në javën 23-të të vitit 2015. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 1 – 23 të vitit 2015 dhe 2016. Numri i rasteve.




Në javën e 23-të të vitit 2016 vërehet një trend në rënie i numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 8% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 22 dhe javën 23 të vitit 2016. Incidenca (raste/10.000)



Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve

Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” në javët 1 – 23 të vitit 2015 dhe 2016. Numri i rasteve.



Në javën e 23-të të vitit 2016 vërehet trend i qëndrueshëm i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme dhe ky numër është 10% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 22 dhe 23 të vitit 2016. Incidenca (raste/10.000)

