

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 48, 28 Nëntor – 4 Dhjetor 2016

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, LUSHNJË, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEÇ, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, dy rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 48

	JAVA 48
DIARRE PA GJAK	1.118
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	6.647
INF. RESP. TE POSHTËME	3.340
RASH ME TEMPERATURË	31
VERDHËZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	399
% e Njësive Raportuese	93% (399/427)


Rash me temperaturë

18 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit, 3 raste nga rrethi i Pogradecit, 1 raste nga rrethi i Kavajës, 2 raste nga rrethi i Vlorës dhe 7 raste nga rrethi i Tiranës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.


Duke u nisur nga shpërthimet epidemike të Fruthit që po ndodhin në disa shtete të Europës dhe Ballkanit, në komunikimin me epidemiologët e rretheve është theksuar përforcimi i Survejancës së sindromit “rash makulopapular me temperaturë” nga mjekët Pediatër dhe Infeksionistë dhe marrja e mostrave të gjakut nga rastet e suspektuara.

Infeksione Respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtë sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtë sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtë paraqitet i qëndrueshëm në javën e 48 krahasuar me javën paraardhëse, java e 47.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i “Diarre pa gjak” paraqet rënie në javën e 48 krahasuar me javën paraardhëse, java e 47.

Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” në javët 30 – 48 të vitit 2015 dhe 2016. Numri i rasteve.




Në javën e 48-të të vitit 2016 vërehet një trend në rënie i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme dhe ky numër është 2% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas grupmoshës në javën 48-të të vitit 2016. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)




Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 47 dhe 48 të vitit 2016. Incidenca (raste/10.000)




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 30 – 48 të vitit 2015 dhe 2016. Numri i rasteve.



Në javën e 48-të të vitit 2016 vërehet një trend në rënje i numrit të rasteve të “Diarreve pa gjak” dhe ky numër është 4% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 47 dhe javën 48 të vitit 2016. Incidenca (raste/10.000)



Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nivelet e Raportimit për javën e 48 sipas rretheve, në përqindje.

