



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË**

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFKEKTI

**ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUDHËN
7 SHKURT – 13 SHKURT 2011
(JAVA 06)**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KRUJË, KUKËS, KURBIN, LIBRAZHD, MIRDITË, MALLAKASTËR, PEQIN, PUKË, TROPOJË, VLORE.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

M. MADHE, TEPELENË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 6-të


	JAVA 06
DIARRE PA GJAK	766
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	9.747
INF. RESP. TE POSHTEME	6.168
RASH ME TEMPERATURE	7
VERDHEZA	0
HEMORAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	364
% e Njësive Raportuese	86%(364/420)

Rash me temperaturë


4 raste janë raportuar nga rrathi i Fierit dhe 3 raste nga rrathi i Pogradecit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekët infekzionistë dhe epidemiologë të rretheve përkatës, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Infekzionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i InfekSIONEVE Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e InfekSIONEVE Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i InfekSIONEVE Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënienë të lehtë në javën e 6-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 5-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave



Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rritje në javën e 6-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 5-të.


Trendi i “InfekSIONEVE Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 40 – 06 të sezonit 2009 - 2010 dhe të sezonit 2010 - 2011. Numri i rasteve.




Frekuencia e hasjes së “InfekSIONEVE Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rritheve në javën e 5-të dhe javën e 6-të të vitit 2011. Incidencia (raste/10.000)




Krahasimi i aktivitetit të “InfekSIONEVE Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemi. Raste/100.000




**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 40 – 06 të sezonit 2009 - 2010 dhe të sezonit 2010 - 2011.
Numri i rasteve.**



Frekuencia e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën në javën e 5-të dhe javën e 6-të të vitit 2011. Incidencia (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 6^{te} sipas rretheve, në përqindje.




Sëmundje e Rëndë Respiratore Akute (SRRA)

Në sistemin e Survejancës së Dedikuar Spitalore përfshihen edhe 2 sindromat e mëposhtëme:


- Insuficiencë Respiratore Akute (IRA)/ Sëmundje e Rëndë Respiratore Akute (SRRA)
- Sëmundje e rëndë e pashpjeguar dhe vdekje e papritur.

Pesha specifike e SRRA ndaj numrit të rasteve që është marrë mostër



Nga data 1 Dhjetor 2010 deri në datën 18 Shkurt 2011 janë marrë gjithsej 545 mostra nga persona të dyshuar me Grip, prej të cilëve 37(7%) raste kanë paraqitur komplikacione (SRRA). 4 raste ose 11% e tyre janë raportuar gjatë muajit dhjetor 2010, 21 prej rasteve me SRRA ose 57% e tyre janë raportuar gjatë muajit janar dhe 12 raste ose 32% e tyre gjatë muajit shkurt 2011

Vendi i marrjes se mostrave dhe rezultati laboratorik




12 prej mostrave ose 32% e tyre janë konfirmuar me viruset e Gripit.

2(5%) mostra janë konfirmuar me virusin B

10(27%) prej tyre me virusin A të gripit [8(22%) mostra A/H1N1 dhe 2(5%) A/H3].

Shpërndarja e rasteve SRRA sipas grupmoshës



Pacientët me Grip prej virusit A i përkasin pothuajse të gjithë grupmoshave:

- 1-4 vj vërehet 1 rast ose 33% e totalit kësaj grupmoshe;
- 5-14 vj vërehet 1 rast ose 33% e totalit të grupmoshës ;
- 25-44 vj vërehen 2 raste ose 50% e totalit të grupmoshës ;
- 45-59 vj, vërehen 2 raste ose 33% e totalit të grupmoshës ;
- 60+ vj, vërehen 4 raste ose 50% e totalit të grupmoshës ;

Rastet me Grip prej virusit B i përkasin grupmoshës 15-24vj me 1 rast ose 14% e rasteve të kësaj grupmoshe dhe grupmoshës 25-44vj me 1 rast ose 25% e rasteve të kësaj grupmoshe.