



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 10 5 - 11 Mars 2018

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, PEQIN,

34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, Durrës, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEÇ, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORE.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 10

	JAVA 10
DIARRE PA GJAK	1.040
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	10.035
INF. RESP. TE POSHTËME	5.493
RASH ME TEMPERATURË	17
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	398
% e Njësive Raportuese	93% (398/427)

Rash me temperaturë

3 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit, 1 rast nga rrethi i Matit, 7 raste nga rrethi i Tiranës dhe 3 raste nga rrethi i Vlorës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rretheve rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.


Të dyshuar për Fruth janë 1 rast nga rrethi i Tiranës dhe 2 raste nga rrethi i Vlorës

Verdhëza


Rasti është i grupmoshës 45-59 vjeç dhe është raportuar nga rrethi i Fierit, i hospitalizuar në repartin e sëmundjeve infektive.

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet 10% rënie në javën e 10 krahasuar me javën paraardhëse, java 09

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqet rënie në javën 10 krahasuar me javën paraardhëse, java 09

Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 – 10 të vitit 2017 dhe të vitit 2018. Numri i rasteve.




Në javën e 10 të vitit 2018 vërehet një trend në rënie i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 22% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 10 të vitit 2018. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)




Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 09 dhe 10 të vitit 2018. Incidenca (raste/10.000)




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 01 – 10 të vitit 2017 dhe të vitit 2018.
Numri i rasteve.



Në javën 10 të vitit 2018 vërehet një trend në rënie i numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 24% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 09 dhe javën 10 të vitit 2018. Incidenca (raste/10.000)



Nga komunikimi me rrethet, shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nga komunikimi me rrethet që kanë rritje të rasteve nuk janë evidentuar shpërthime epidemike.

Nivelet e Raportimit për javën e 10 sipas rretheve, në përqindje.