



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 07 11 - 17 Shkurt 2019

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 07

	JAVA 07
DIARRE PA GJAK	1.277
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	11.696
INF. RESP. TE POSHTËME	5.840
RASH ME TEMPERATURË	42
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	398
% e Njësive Raportuese	93% (398/427)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog 13 raste si më poshtë nuk janë të dyshuara për fruth dhe rubeolë por për varicelë:

Fier – 6 raste

Vlorë – 7 raste

Ndërsa të dyshuar për Fruth janë 15 raste raste nga rrethi i Tiranës, 7 raste nga rrethi Lezhës, 5 raste nga rrethi i Durrësit, dhe 2 raste nga rrethi i Shkodrës.

Verdhëza


Rasti është i grupmoshës 60+ vjeç i raportuar nga rrethi i Fierit. Më pas diagnoza rezultoi me natyrë jo infektive.

Ethe e pashpjegueshme


Rasti është i grupmoshës 15-44 vjeç dhe është raportuar nga rrethi i Fierit. Më pas diagnoza u konfirmua “Brucelozë”.

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet 15% rënie në javën 07 krahasuar me javën paraardhëse, java 06

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqet rënie në javën 07 krahasuar me javën paraardhëse, java 06

Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 – 07 të vitit 2018 dhe të vitit 2019. Numri i rasteve.




Në javën 07 të vitit 2019 vërehet prirje në rënie e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 28% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 07 të vitit 2019. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)




Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 06 dhe 07 të vitit 2019. Incidenca (raste/10.000)



Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 01 – 07 të vitit 2018 dhe të vitit 2019. Numri i rasteve.

Në javën 07 të vitit 2018 vërehet prirje në rënie e numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 6% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 06 dhe javën 07 të vitit 2019. Incidenca (raste/10.000)

Nga komunikimi me rrethet, shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nga komunikimi me rrethet që kanë rritje të rasteve nuk janë evidentuar shpërthime epidemike.

Nivelet e Raportimit për javën e 07 sipas rretheve, në përqindje.

