



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 02 6- 12 Janar 2020

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

1 rreth ose 3% (=1/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS

35 rrethe ose 97% (=35/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, Durrës, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, M. MADHE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PEQIN, PËRMET, POGRADEÇ, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 02

	JAVA 02
DIARRE PA GJAK	1.209
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	8.636
INF. RESP. TE POSHTËME	4.690
RASH ME TEMPERATURË	23
VERDHEZA	2
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	398
% e Njësive Raportuese	93% (398/427)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog 23 raste si më poshtë nuk janë të dyshuara për fruth dhe rubeolë por për varicelë:

Fier – 14 raste

Vlorë – 9 raste


Të dyshuar për fruth janë 2 raste nga rrethi i Tiranës

Verdhëza


Rastet janë të grupmoshës 45 – 59 vjeç 60+ vjeç të raportuara nga rrethi i Fierit. Më pas në një prej rasteve diagnoza rezultoi me natyrë jo infektive ndërsa rasti tjetër Leptospirozë.

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ritje në javën e 02 krahasuar me javën paraardhëse, java 01.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqitet e qëndrueshme në javën 02 krahasuar me javën paraardhëse, java 01.

Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 45 – 02 të sezonit 2018-2019 dhe 2019-2020. Numri i rasteve.




Në javën e 02 të vitit 2020 vërehet një prirje në ritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është pothuajse i njëjte krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 02 të vitit 2019. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)



Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 01 dhe 02 të vitit 2020. Incidenca (raste/10.000)




Vërehet ritje e IRA në shumë rrethe të vendit

Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 45 – 02 të sezonit 2018-2019 dhe 2019-2020.
Numri i rasteve.



Në javën 02 të vitit 2020 vërehet prirje në rënie e numrit të rasteve të “Diarreve pa gjak” dhe ky numër është më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 01 dhe javën 02 të vitit 2020. Incidenca (raste/10.000)



Nga komunikimi me rrethet Durrës, Lezhë, Krujë dhe Tiranë, si edhe me rrethet e tjera të vendit shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nivelet e Raportimit për javën e 02 sipas rretheve, në përqindje.

