



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 36 4 – 10 Shtator 2023

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 NJVKSH ose 100% (=36/36) e tyre

35 NJVKSH ose 97% (=35/36) e tyre kanë raportuar në platformën dixhitale SISI:

BERAT, BULQIZË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, LUSHNJE, MALLAKASTËR, M. MADHE, MAT, MIRDITË, PEQIN, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 1 NJVKSH ose 3% (=1/36) e tyre: HAS

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 36

	JAVA 36
DIARRE PA GJAK	2.545
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	6.058
INF. RESP. TE POSHTËME	2.236
RASH ME TEMPERATURË	10
VERDHEZA	0
ETHE E ZGJATUR E PASHPJEGUAR (> 3 JAVE)	0
ANOMALI KONGENITALE	2
KONJUKTIVIT AKUT TEK NEONATËT	0
Numri i Njësive Raportuese	413
% e Njësive Raportuese	93% (413/446)

Rash me temperaturë


Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë dhe dorë-këmbë-gojë:

Kukës – 3 raste


Tiranë –7 raste

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet e qëndrueshme në javën 36 krahasuar me javën paraardhëse, java 35.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rënie në javën 36 krahasuar me javën paraardhëse, java 35.

Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 25 - 36 të vitit 2022 dhe 2023. Numri i rasteve.




Në javën 36 të vitit 2023 vërehet prirje e qëndrueshme e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.

Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 35 dhe 36 / 2023. Incidenca (raste/10.000)




Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 25 - 36 të vitit 2022 dhe 2023. Numri i rasteve.



Në javën 36 të vitit 2023 vërehet prirje në rënie e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 35 dhe 36 / 2023. Incidenca (raste/10.000)



Nga komunikimi me NJVKSH shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Ngjarje ndërkombëtare

1. *Fruthi – Monitorimi i shpërthimeve evropiane*

- Në korrik 2023, 159 raste të konfirmuara të fruthit u raportuan nga 12 vende. Midis janarit dhe korrikut 2023, 695 raste të fruthit janë raportuar në Sistemin Evropian të Survejancës (TESSy) nga 17 vende.
- Në Rumani raportohen shpërthime të vazhdueshme.
- Transmetimi i fruthit është aktualisht i ulët në BE/EEA.

2. *MERS-CoV - Shumë vende*

- Që nga përditësimi i mëparshëm më 28 korrik 2023, tri raste të reja MERS-CoV, përfshirë dy vdekje, janë raportuar nga Arabia Saudite me datat e fillimit në nëntor dhe dhjetor 2022 dhe janar 2023.
- Dy nga këto raste raportuan kontakt me deve dhe të gjitha rastet kishin sëmundje shoqëruese.
- Ndjekja e kontakteve të ngushta nuk identifikoi asnjë rast dytësor dhe identifikoi deve pozitive që kishin kontakt me dy rastet e raportuara, të cilat ishin të izoluara derisa testi RT-PCR rezultoi negativ.
- Që nga fillimi i vitit 2023 dhe që nga 4 shtatori 2023, janë raportuar dy raste MERS-CoV me datën e fillimit në 2023 nga Emiratet e Bashkuara Arabe (1) dhe Arabia Saudite (1).

3. *Lija e majmunit(Mpox) - 2022 - 2023*

- Që nga përditësimi i fundit më 11 gusht 2023 dhe që nga 6 shtatori 2023, 58 raste me linë e majmunit janë raportuar në Sistemin Evropian të Mbikëqyrjes (TESSy) nga 10 vende të BE/EEA: Portugalia (31), Spanja (13), Franca (4), Irlanda (3), Gjermania (2), Islanda (1), Italia (1), Luksemburgu (1), Holanda (1) dhe Suedia (1).
- Në përgjithësi, 21 391 raste të konfirmuara të mpox janë raportuar nga 29 vende të BE/EEA në TESSy.
- Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), që nga 1 janari 2022 dhe nga 5 shtatori 2023, janë raportuar 89 752 raste të konfirmuara të mpox, duke përfshirë 157 vdekje nga 114 vende në mbarë botën.

4. *Botulizmi jatrogjen - - 2023*

- Më 1 shtator 2023, Norvegjia raportoi një rast të dyshuar të botulizmit jatrogjen, pas një trajtimi me injeksione të neurotoksinës botulinum në Stamboll. Në këtë fazë, nuk është e qartë nëse ky rast lidhet me shpërthimin e rasteve të botulizmit jatrogjen që lidhen me injeksionet intragastrike të neurotoksinës botulinum të administruara në Turqi në mars 2023.
- Deri më 30 mars 2023, 34 raste të botulizmit janë raportuar në Gjermani (30 raste), Austri (një rast), Francë (një rast) dhe Zvicër (dy raste). Rastet iu nënshtruan një procedure mjekësore që konsiston në injeksion intragastrik të neurotoksinës botulinum për të trajtuar obezitetin në Turqi midis 3 dhe 25 shkurt 2023.
- Për më tepër, Pika Kombëtare Fokale e Rregulloreve Ndërkombëtare të Shëndetit (IHR) për Turqinë ka raportuar 53 raste të botulizmit midis 28 shkurtit dhe 8 marsit 2023 midis individëve

që iu nënshtruan të njëjtës procedurë në dy spitale private në Stamboll (50 raste) dhe Izmir (tre raste).

- Ndër 65 raste me informacion të njohur, procedura është kryer në një klinikë të vetme në Stamboll, Turqi.

5. Infeksionet me Echovirus 11 te neonatët - 2022-2023

- Që nga përditësimi i fundit më 1 gusht 2023 dhe deri më 7 shtator, nuk është raportuar asnjë rast i ri.
- Rastet e mëposhtme janë raportuar në BE/EEA, sipas përkufizimeve të rasteve të ECDC: 12 raste të konfirmuara, 10 raste të mundshme dhe nëntë raste të dyshuara, duke përfshirë tetë vdekje.
- Viruset e izoluar nga rastet në Itali i përkasin të njëjtit grup me ato të izoluar në Francë në vitin 2023 dhe janë pjesë e një linje të re divergjente.
- Duke pasur parasysh shfaqjen shumë të rrallë të infeksioneve të tilla të rënda, ECDC vlerëson rrezikun për popullatën e përgjithshme neonatale në BE/EEA si të ulët.

6. Survejanca sezonale e virusit të Nilit Perëndimor - 2023

- Që nga përditësimi i fundit dhe më 6 shtator 2023, 103 raste njerëzore të infeksionit me virusin e Nilit Perëndimor (WNV) janë raportuar nga vendet e BE/EEA dhe pesë nga një vend fqinj me BE-në.
- Që nga fillimi i sezonit të transmetimit 2023, 387 raste njerëzore të infeksionit WNV janë raportuar nga vendet e BE/EEA dhe 62 nga vendet fqinje të BE-së.
- Ka pasur 26 shpërthime midis ekuidëve dhe 115 shpërthime midis shpendëve të raportuara nga vendet e BE/ZEE që nga fillimi i sezonit të transmetimit të WNV 2023, që nga 6 shtator 2023.

7. Rastet autoktone të Dengues - Itali - 2023

- Që nga java e parë e gushtit dhe që nga 6 shtatori 2023, janë zbuluar 10 raste të etheve denge të fituara në nivel lokal në rajonet e Lombardisë (7) dhe Lacios (3) të Italisë.
- Masat e reagimit dhe kontrollit po zbatohen nga autoritetet italiane të shëndetit publik. Këto përfshijnë gjetjen e rasteve, aktivitetet e kontrollit të vektorit, informacionin për ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe publikun e gjerë, dhe masat parandaluese për dhuruesit e substancave me origjinë njerëzore (p.sh. gjaku dhe organet).
- Raste të tjera autoktone mund të ndodhin në rajonet e prekura dhe në Itali në përgjithësi, dhe survejanca është forcuar për të zbuluar herët rastet e reja, për të identifikuar zinxhirët e transmetimit, për të përcaktuar zonat në rrezik dhe për të përcaktuar nivelin e rrezikut.
- Meqenëse vektori i mushkonjave *Aedes albopictus* është i pranishëm në pjesën më të madhe të Evropës, futje të mëtejshme të virusit që çojnë në transmetime dytësore autoktone mund të ndodhin në shumicën e vendeve jugore të BE/EEA.

Sëmundja e Legjionarëve - Poloni - 2023

- Më 8 shtator 2023, Inspektori Sanitar Shtetëror i Qarkut në Rzeszów, Poloni dha një përditësim mbi një shpërthim të sëmundjes së Legjionarëve, duke përfshirë aktualisht 166 raste të konfirmuara dhe 22 vdekje.
- Shumica e rasteve banojnë në qytetin Rzeszów (112) dhe Rzeszów powiat (38) në provincën Podkarpackie në Poloninë juglindore.
- Vazhdojnë hetimet epidemiologjike dhe mikrobiologjike për të identifikuar burimin e kësaj shpërthimi.

8. Monitorimi i grumbullimeve masive - Kupa e Botës Rugby 2023

- ECDC po monitoron Kupën e Botës Rugby 2023 përmes aktiviteteve të saj të inteligjencës epidemike nga 4 shtatori deri më 3 nëntor 2023, duke raportuar në baza javore.
- Nuk u zbuluan ngjarje me rëndësi publike në lidhje me ngjarjen nga data 4 deri më 8 shtator 2023.

Gripi i shpendëve me patogjenitet të lartë (HPAI) në Mbretërinë e Bashkuar dhe disa vende të tjera të Evropës.

Vlerësimi i përditësuar i shpërthimit të gripit në shpendë 18 gusht 2023

Që nga vlerësimi i fundit i shpërthimit më 11 korrik 2023, ka pasur raporte të mëtejshme për gripin e shpendëve me patogjenitet të lartë (HPAI) H5 në shpendët shtëpiake, në Mbretërinë e Bashkuar (MB). Këto përfshijnë 9 ambiente të reja të infektuara (IP) të konfirmuara me HPAI H5N1. Pesë nga shpërthimet ishin fazanët, 2 të tjerat ishin shpendë në ambient komercial 1 në oborr dhe 1 në qendër për mbrojtjen e shpendëve të egër (pulëbardha). Ka pasur 114 ngjarje HPAI H5 që përfshijnë 370 zogj të egër “të gjetur të ngordhur” në Britaninë e Madhe që nga koha e vlerësimit të fundit. Kjo përfshinte një javë në korrik me 161 raste të shpendëve të egër. Edhe pse rastet e gjetura të ngordhura të shpendëve të egër kanë rënë në javët e fundit niveli i rrezikut të shpendëve të egër në të gjithë Britaninë e Madhe mbetet i lartë. Masat parandaluese në shpendë tani janë hequr, ndalimi i grumbullimeve të shpendëve mbetet në fuqi në Skoci dhe Uells.

Në të gjithë Evropën, HPAI H5N1 vazhdon të raportohet në shpendët vendas duke përfshirë zogjtë e egër, megjithëse numri i rasteve të shpendëve të egër po bie javë pas jave me shumë pak shpërthime të shpendëve të raportuara në korrik dhe gusht. Që nga 11 korriku 2023, Organizata Botërore për Shëndetin e Kafshëve (WOAH) ka raportuar shpërthime të HPAI H5N1 në shpendët vendas në Danimarkë, Francë, Gjermani, Hollandë dhe Rusi. HPAI H5N1 me ngjarjet në speciet jo të shpendëve, duke përfshirë zogjtë e egër, janë raportuar nga WOAH në Austri, Belgjikë, Republikën Çeke, Danimarkë, Estoni, Finland, Francë, Gjermani, Hungari, Irland, Itali, Letoni, Holland, Norvegji, Poloni, Rusi, Spanjë, Suedi dhe Zvicër. Ka pasur gjithashtu raporte për HPAI të deklaruara ose pjesërisht të deklaruara në Belgjikë, Finlandë dhe Norvegji. Frekuenca e lartë e rasteve të pulëbardhave me kokë të zezë të zogjtë e egër në Evropë ka vazhduar që nga vlerësimi ynë i fundit, edhe pse speciet të tjera duke përfshirë dhe shpendë të llojeve të tjera të zakonshme rezultojnë të prekur. Ka pasur edhe përhapje të HPAI H5N1 te gjitarët (kryesisht dhelpra arktike) në Finlandën jugperëndimore. Numri i shpërthimeve të HPAI në fermat e shpendëve çdo javë në të gjithë Evropën ka rezultuar i ulët, me vetëm disa ose aspak shpërthime çdo javë gjatë javëve të fundit. Numri i rasteve të shpendët e egër, ka rënë vazhdimisht çdo javë për pesë javët e fundit, megjithëse nga një nivel i lartë mbi 100 raste në javë me 42 dhe 18 raste në javë përkatësisht në dy javët e fundit. Veçanërisht përqindja e kokëzezave pulëbardha në javën e 31-të ka rënë në pak më shumë se 10% (pesë nga 42 zbulime). Pulëbardhat me kokë të zezë përbënin 56% të rasteve të shpendëve të egër për shembull në javën e 24-të vitit 2023.

Masat e parandalimit të gripit të shpendëve

Duke pasur parasysh përhapjen e paprecedentë të virusit të gripit të shpendëve AH5N1 midis shpendëve dhe gjitarëve dhe rrezikut të mundshëm për shëndetin e njeriut, partnerët trepalësh - FAO, OBSH dhe WOAHA u bëjnë thirrje vendeve të ndërmarrin veprimet e mëposhtme:

- ✓ Parandalimi i gripit të shpendëve në burimin e tij, kryesisht përmes masave të zgjeruara të biosigurisë në ferma dhe zbatimi i praktikave të mira higjienike. Anëtarët e WOAHA në konsultim me sektorin e shpendëve, mund të marrin në konsideratë vaksinimin.
- ✓ Vlerësimi i rrezikut mbi gjasat e përhapjes së gripit të shpendëve shumë patogjen H5N1 lidhur me panairë, shfaqje, tregje, shitje dhe grumbullime të tjera të shpendëve.