



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 44 30 Tetor – 5 Nëntor 2023

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 NJVKSH ose 100% (=36/36) e tyre

36 NJVKSH ose 100% (=36/36) e tyre kanë raportuar në platformën dixhitale SISI:

BERAT, BULQIZË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, M. MADHE, MAT, MIRDITË, PEQIN, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 0 NJVKSH ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 44

	JAVA 44
DIARRE PA GJAK	1.180
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	6.895
INF. RESP. TE POSHTËME	2.679
RASH ME TEMPERATURË	13
VERDHEZA	0
ETHE E ZGJATUR E PASHPJEGUAR (> 3 JAVE)	0
ANOMALI KONGENITALE	0
KONJUKTIVIT AKUT TEK NEONATËT	0
Numri i Njësive Raportuese	408
% e Njësive Raportuese	92% (408/446)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë dhe dorë-këmbë-gojë:


Krujë – 4 raste

Lushnje – 2 raste


Tiranë –7 raste

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet e qëndrueshme në javën 44 krahasuar me javën paraardhëse, java 43.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqitet ritje në javën 44 krahasuar me javën paraardhëse, java 43.

Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 35 - 44 të vitit 2022 dhe 2023. Numri i rasteve.




Në javën 44 të vitit 2023 vërehet prirje e e qëndrueshme e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.

Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 43 dhe 44 / 2023. Incidenca (raste/10.000)




Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 35 - 44 të vitit 2022 dhe 2023. Numri i rasteve.



Në javën 44 të vitit 2023 vërehet prirje në ritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 43 dhe 44 / 2023. Incidenca (raste/10.000)



Nga komunikimi me NJVKSH shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Ngjarje ndërkombëtare

1. Survejanca sezonale e virusit të Nilit Perëndimor– 2023

- Që nga përditësimi i fundit dhe që nga 1 nëntori 2023, tetë raste njerëzore të infeksionit me virusin e Nilit Perëndimor (WNV) janë raportuar nga vendet e BE/EEA dhe asnjë nuk është raportuar nga vendet fqinje të BE-së.
- Që nga fillimi i sezonit të transmetimit 2023, 680 raste njerëzore të infeksionit WNV janë raportuar nga vendet e BE/EEA dhe 91 nga vendet fqinje të BE-së.
- Që nga fillimi i sezonit të transmetimit të WNV 2023, dhe që nga 1 nëntori 2023, vendet e BE/EEA kanë raportuar 134 shpërthime në mesin e ekuidëve dhe 234 shpërthime midis shpendëve.

2. Monitorimi i grumbullimeve masive – Kupa e Botës Rugby 2023, Francë

- Nuk u zbuluan kërcënime ndërkufitare të lidhura me Kupën e Botës në Rugby ndërmjet 4 shtatorit dhe 3 nëntorit 2023.
- Monitorimi i inteligjencës epidemike të Kupës së Botës Rugby Francë 2023 përfundon më 3 nëntor 2023.

3. Zbulimi i virusit të etheve hemorragjike Krime-Kongo te rriqnat në Francën jugore

- Franca raportoi zbulimin e virusit të etheve hemorragjike Krime-Kongo (CCHF) te rriqnat e species *Hyalomma marginatum*, të mbledhura nga bagëtia në departamentin Pyrenees-Orientales në prill 2023.
- Ky konstatim vërteton për herë të parë praninë e virusit në Francë.
- Mundësia e infektimit të njeriut nëpërmjet pickimit të rriqnave është aktualisht shumë e ulët, duke qenë se rriqnat janë aktive vetëm në pranverë (prill-korrik).
- Mundësia e transmetimit të drejtpërdrejtë nëpërmjet kontaktit me lëngjet trupore nga gjitarët e vegjël të infektuar si lepujt, aktualisht konsiderohet e ulët.