REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 08 19 – 25 Shkurt 2024

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 NJVKSH ose 100% (=36/36) e tyre

36 NJVKSH ose 100% (=36/36) e tyre kanë raportuar në platformën dixhitale SISI:

BERAT, BULQIZË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUJË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, M. MADHE, MAT, MIRDITË, PEQIN, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË,VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 0 NJVKSH ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 08

	JAVA 08
DIARRE PA GJAK	1.180
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	10.248
INF. RESP. TE POSHTËME	5.230
RASH ME TEMPERATURË	28
VERDHEZA	0
ETHE E ZGJATUR E PASHPJEGUAR (> 3 JAVE)	0
ANOMALI KONGENITALE	0
KONJUKTIVIT AKUT TEK NEONATËT	0
Numri i Njësive Raportuese	432
% e Njësive Raportuese	98% (432/441)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë dhe dorë-këmbë-gojë:

Fier – 4 raste

Mat – 3 raste

Tiranë – 28 raste

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve



Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave



Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën 08 krahasuar me javën paraardhëse, java 07.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve



Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave



Prirja në kohë e "Diarreve pa gjak" paraqitet ritje në javën 08 krahasuar me javën paraardhëse, java 07.

Krahasimi i aktivitetit të "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000



Prirja e "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" në javët 01 – 08 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve.



Në javën 08 të vitit 2024 vërehet prirje në rënie e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.

Frekuenca e "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Frekuenca e hasjes së "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" sipas NJVKSH në javën 07 dhe 08 / 2024. Incidenca (raste/10.000)



Prirja e "Diarreve pa Gjak" në javët në javët 01 - 08 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve.



Në javën 08 të vitit 2024 vërehet prirje në ritje e numrit të rasteve "Diarre pa gjak".

Frekuenca e hasjes së "Diarreve pa gjak" sipas NJVKSH në javën 07 dhe 08 / 2024. Incidenca (raste/10.000)



Nga komunikimi me NJVKSH shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Ngjarje ndërkombëtare

1. *Poliomieliti –Monitorimi mujor i shpërthimeve globale*

• Nuk ka pasur raporte të rasteve të paralizës flakside akute (AFP) për shkak të poliomielitit me fillimin e simptomave në vitin 2024.

• Në 2023, dhe që nga 20 shkurt 2024, 133 raste të AFP shkaktuar nga cVDPV1 u raportuan nga tre vende: DRC (105), Madagaskari (24) dhe Mozambiku (4).

• Në vitin 2023, 372 raste të AFP-së të shkaktuara nga cVDPV2 u raportuan nga 22 vende: Benini (3), Burkina Faso (2), Burundi (1), Republika e Afrikës Qendrore (14), Çadi (54), Bregu i Fildishtë (6), DRC (118), Guinea (46), Indonezia (6), Izraeli (1), Kenia (8), Mali (12), Mauritania (1), Mozambiku (1), Nigeri (2), Nigeria (81), Somalia (5), Sudani i Jugut (2), Tanzania (3), Jemeni (4), Zambia (1) dhe Zimbabve (1).

Ngjarje kombëtare

2. *Situata epidemiologjike e fruthit ne vend*

Për periudhën Janar – 20 shkurt 2024 janë testuar 117 raste të dyshuar me fruth nga të cilët janë konfirmuar 31 (26.5%) raste me Fruth. Nga këto 28 raste janë konfirmuar në laboratorin kombëtar të referencës të virologjisë në ISHP dhe 3 raste jane te konfirmuar sipas përkufizimit të rastit mbështetur në shenjat klinike dhe epidemiologjike. Incidenca e sëmundjes në vend është 1.1 raste/100 000 banorë. Rastet i përkasin moshës nga 0-38 vjec (mediana 5.5 vjec).

Numri më i lartë i përket grupmoshës 5-9 vjec me 35.5% të totalit të rasteve të konfirmuar. Incidenca më e lartë është në grupmoshën 2-4 vjec me 1.3 raste/100 000 banorë. Nga 31 rastet e konfirmuar 19 (61%) prej tyre janë shtruar në spital dhe 12 raste (39%) kanë qëndruar në kushte shtëpie.