



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 16
14 Prill – 20Prill 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 33 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 91.6% (=33/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	8 / 10	80%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	0 / 13	0%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	0 / 7	0%
	Korcë	Korçë	20 / 20	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	14 / 15	93%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	1 / 19	5%
		M. Madhe	0 / 6	0%
		Pukë	11 / 11	100%
	Kukës	Kukës	14 / 14	100%

		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	6 / 9	67%
	Lezhë	Lezhë	10 / 11	91%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	3 / 8	38%
VLORE	Vlorë	Vlorë	20 / 20	100%
		Sarandë	8 / 9	89%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	374 / 432	87%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 16

	JAVA 16
Diarre pa gjak	1295
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	7689
Inf. Resp. te poshtëme	3299
Rash me temperaturë	33
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	374
% e Njësive Raportuese	87% (374/432)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:



Kurbin – 2 raste

Fier – 6 raste

Tiranë – 21 raste


Peqin – 3 raste

Pogradec – 1 raste


Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 16 krahasuar me javën paraardhëse, java 15.

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ulje në javën 16 krahasuar me javën paraardhëse, java 15.

Grafiku 5. Krahاسimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Grafiku 6. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 - 16 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 16 të vitit 2025 vërehet një ulje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 7. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 8. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 15 dhe 16/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 9. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 01 - 16 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 16 vërehet prirje në ulje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak” ,këtë vit vërehet një numër me i larte i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 10. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 15 dhe 16/ 2025.
Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje kombëtare

Gripi i shpendëve -përditësim i situatës në vendin tonë

Nga data 30.10.2024 -20.04.2025 numri vatrave të gripit të shpendëve në shpendë të raportuara në njoftimin e menjëhershëm nga MBZHR rezulton në 11. Nga përditësimi i fundit datë 20.04.2025 nuk ka raportime për vatra të reja të identifikuar në shpendë, shpërthimi në 2 kapanone të stabilimenteve REAS dhe AIBA të raportuara më datë 08.04.2025 në pula për vezë dhe zogj, vijojnë të jenë aktive. Nga monitorimi i kryer në këto stabilimente nga grupet e punës në terren janë marrë 30 kampione material patologjik për ekzaminim tampon nga kloaka dhe trakeja, të cilët kanë rezultuar Pozitiv për A(H5N1) me metodën molekulare Molekulare RT-PCR

Tabela 3. Numri i vatrave të raportuara në shpendë për periudhën 30.10.2024 - 20.04.2025

Njvks	Nr.vatrave total	Vendndodhja	Lloji i shpendëve të prekur
Tiranë	4	Kodër -Mëzez /zalt	Pulë fushe
		Zall-Herr	Pulë deti
		Babrru qendër	Pulë fushe
		Pakuqan	Pulë fushe
Vlorë	2	Plazhi vjetër	Shpend i egër /pulëbardhë
		Laguna Nartë	Shpend i egër Pelikan/patë e egër
Lushnjë	1	Laguna Karavasta	Pulëbardhë kembë verdhë
Gjirokastër	1	Lunxhëri/Valare	Pulë fushe
Durrës	3	Rrashbull/Reas	Pula/prodhimi /veze
		Kulle/Sukth	Pulë fushe
		Rrashbull /Aiba	Pula prodhimi/zogj
Total	11		

Testimi dhe Diagnostikimi në shpendë

Nga ISUV janë raportuar (30 Mostra) të marra në shpendë, të cilat kanë rezultuar Pozitiv për Influenca Aviare A(H5N1).

Testimi dhe Diagnostikimi në njerëz

Nga NJVKSH Durrës që nga fillimi i shpërthimeve janë marrë për depistim të punonjësve të pularive Aiba dhe Reas (shpërthim pule oborri në fshatin Kullë. Në total 80 mostra nga të cilat 40 i përkasin punonjësve të AIBA 39 Reas dhe 1mostër familje (fshati Kulle). Të gjitha mostrat e testuara në ISHP kanë rezultuar negative për gripin e shpendëve.

Rast Anthrax në Gjedh- Tepelenë

Në fshatin Progonat, zona Gardisht, është konstatuar një rast me sëmundjen e plasjes në një lopë që ngordhi papritur. Mostra u mor nga Shërbimi Veterinar i Tepelenës dhe pas analizave nga ISUV, rezultoi pozitive. Tufa e prekur përmban 300 dhi dhe 39 gjedhë. Pas konfirmimit, lopës iu bë groposja dhe djegia sipas protokollit, ndërsa mishi nuk është përdorur për konsum. Tufa është vaksinuar menjëherë. Personat të cilët kanë manipuluar me kafshën e ngordhur nuk kanë shfaqur asnjë problem shëndetësor. Situata është në monitorim të vazhdueshëm.

Ngjarje ndërkombëtare***Fruthi –Monitorimi i shpërthimeve evropiane – monitorim mujor***

- Në shkurt 2025 janë raportuar 821 raste të fruthit nga 14 vende dhe gjashtëmbëdhjetë vende raportuan zero raste.
- Nëpërmjet aktiviteteve të tij të inteligjencës epidemike, ECDC ka identifikuar edhe 3 012 raste të reja nga 15 vende të BE/ZEE.
- Në përgjithësi, katër vdekje të lidhura me fruthin janë raportuar në BE/EEA në vitin 2025, të gjitha në Rumania.
- Ka pasur aktivitete të lartë të fruthit në përgjithësi në BE/ZEE gjatë 12 muajve të fundit; megjithatë, situata ndryshon sipas vendit. Disa vende kanë raportuar shpërthime të mëdha dhe/ose të vazhdueshme, ndërsa të tjerët kanë raportuar ose pa transmetim të qëndrueshëm ose transmetim shumë të ulët.
- Shpërthime të lidhura me raste të importuara të fruthit janë raportuar nga vendet e BE-së.

Vlerësimi i ECDC: Numri i përgjithshëm i rasteve të fruthit në BE/ZEE u rrit në mënyrë të qëndrueshme midis qershorit 2023 dhe Mars 2024 dhe ndërmjet prillit 2024 dhe shkurtit 2025. Rastet e fruthit mund të vazhdojnë të rriten në BE/ZEE në muajt e ardhshëm, në përputhje me sezonalitetin e vërejtur të fruthit. Kjo është për shkak të raportimit të mbulimit jooptimal të vaksinimit për sëmundjen e fruthit vaksinat (MMR) në një numër vendesh të BE/ZEE, si dhe një probabilitet i lartë importimi nga zonat me qarkullim të lartë. Shumica e rasteve të raportuara së fundmi kanë marrë sëmundjen brenda vendit nëpërmjet transmetimit në komunitet/lokal, megjithatë janë raportuar rastet që lidhen me udhëtime ndërkombëtare.

Veprimet: ECDC po monitoron situatën e fruthit përmes aktiviteteve të tij të inteligjencës epidemike. Meqenëse numri i rasteve pritet të rritet në të ardhmen e afërt, ECDC i kërkon autoritetetve të shëndetit publik BE/EEA të përqendrohen në fushat e mëposhtme:

- Arritja dhe ruajtja e mbulimit të lartë vaksinimi për MMR (>95% me dozën e dytë). Është jetike të sigurohet administrimi i vaksinimit të dozës së parë dhe të dytë në kohë sipas kalendareve kombëtare për foshnjat dhe fëmijët. Është gjithashtu e rëndësishme të identifikohen dhe vaksinohen individët e kualifikuar (për shembull, adoleshentët dhe të rriturit jo-imunë) në programe plotësuese të imunizimit (siç rekomandohet nga autoritetet lokale dhe kombëtare).
- Rritje e cilesise se survejances dhe kapaciteteve adekuate të shëndetit publik, veçanërisht për zbulimin e hershëm, diagnostikimin, reagimin dhe kontrollin e shpërthimeve.
- Rritja e ndërgjegjësimit klinik të profesionistëve shëndetësorë, duke përfshirë rëndësine e kontrollit të statusit të vaksinimit të individëve përpara udhëtimit.
- Profesionistët e kujdesit shëndetësor duhet të vaksinohen plotësisht.

Lia e majmunit (Mpox) në BE/ZEE, vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi – 2022–2025

- Që nga përditësimi i fundit më 13 mars 2025 dhe deri më 14 prill 2025, janë regjistruar 142 raste mpox raportuar nga 13 vende të BE/ZEE: Gjermania (57), Spanja (22), Suedia (15), Franca (12), Holanda (10), Danimarka (6), Irlanda (6), Italia (4), Polonia (4), Portugalia (3), Austria (1), Greqia (1), dhe Hungaria (1). Që nga 13 marsi 2025, asnjë vend i ri nuk ka raportuar raste të konfirmuara.
- Që nga fillimi i shpërthimit të mpox dhe më 14 prill 2025, 24 284 raste të konfirmuara të mpox (MPX) janë raportuar nga 29 vende të BE/ZEE
- Shtatëmbëdhjetë raste MPXV të klasit I janë raportuar në BE/EEA që nga gushti 2024 nga Suedia, Gjermania, Belgjika, Irlanda dhe Franca. Të gjithë ishin clade Ib, përveç Irlandës që ishte kladi Ia.

- Rreziku i përgjithshëm i infeksionit mbetet i ulët për meshkujt që bëjnë seks me meshkuj dhe i ulët për meshkujt në popullsi më e gjerë e BE/ZEE.

Lia e majmunit (Mpox) për shkak të virusit të lisë së majmunëve në kategorinë I dhe II – Shpërthimi global – 2024–2025

- Virusi i lisë së majmunëve (MPXV) me kladi I dhe kladi II qarkullojnë në shumë vende, me tendencat epidemiologjike mbeten kryesisht të pandryshuara.
- Shumica e rasteve të mpox clade I në Afrikë raportohen ende nga Republika Demokratike e Kongos (DRC), Burundi dhe Uganda. Uganda vazhdon të tregojë një tendencë në rritje në rastet e raportuara.
- Raste sporadike mpox clade I janë raportuar gjithashtu jashtë Afrikës muajin e kaluar pa asnjë tregues i transmetimit më të gjerë të komunitetit jashtë kontinentit.
- ECDC po monitoron dhe vlerëson nga afër situatën epidemiologjike.