



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 18
28 Prill – 04 Maj 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	9 / 10	90%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	26 / 27	96%
		Librazhd	9 / 11	82%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	20 / 20	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	11 / 11	100%
	Kukës	Kukës	14 / 14	100%
		Has	5 / 5	100%

	Lezhë	Tropojë	9 / 9	100%
		Lezhë	10 / 11	91%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	2 / 8	25%
VLOREË	Vlorë	Vlorë	19 / 20	95%
		Sarandë	8 / 9	89%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	418 / 432	97%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 18

	JAVA 18
Diarre pa gjak	1279
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	7241
Inf. Resp. te poshtëme	3102
Rash me temperaturë	54
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	418
% e Njësive Raportuese	97% (418/432)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Fier – 11 raste

Tiranë – 23 raste

Gjirokastrë – 1 rast

Has – 3 raste



Kavaje – 5 raste

Kruje – 2 raste



Kurbin – 5 raste

Puke – 2 raste

Vlorë – 2 raste


Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 18 krahasuar me javën paraardhëse, java 17.


Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve**Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave**

Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ulje në javën 18 krahasuar me javën paraardhëse, java 17.

Grafiku 5. Krahاسimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Grafiku 6. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 - 18 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 18 të vitit 2025 vërehet një ulje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 7. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 8. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 17 dhe 18/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 9. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 01 - 18 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 18 vërehet prirje në ulje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak” ,këtë vit vërehet një numër me i larte i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 10. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 17 dhe 18/ 2025.
Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje ndërkombëtare

Sëmundja autoktone e virusit chikungunya – Réunion dhe Mayotte, Francë, 2024–2025

- Në gusht 2024, Franca raportoi rastin e parë autoktone të sëmundjes së virusit chikungunya në 10 vjet në Réunion, me fillimin e simptomave më 12 gusht.
- Që nga fillimi i vitit dhe që nga 27 prilli 2025, më shumë se 44,000 raste të konfirmuara autoktone të sëmundjes së virusit chikungunya janë raportuar në Réunion.
- Që nga fillimi i shpërthimit, nëntë vdekje tek individë mbi moshën 70 vjeç me sëmundje bashkëshoqëruese u klasifikuan si të lidhura me sëmundjen e virusit chikungunya.
- Autoriteti i Lartë i Shëndetësisë (HAS) ka këshilluar vendimmarrësit publikë të vaksinojnë grupet që janë në rrezik më të lartë për sëmundje të rënda dhe profesionistët e kontrollit të vektorëve. Agjencia rajonale e shëndetësisë nisi një fushatë vaksinimi për individët me përparësi që nga 7 prilli.
- Më 26 prill 2025, Ministria Franceze e Shëndetësisë raportoi tre ngjarje të rënda negative (SAE) pas vaksinimit kundër chikungunya me vaksinën IXCHIQ në Réunion, përfshirë një vdekje. Si rezultat, autoritetet shëndetësore pezulluan vaksinimin e individëve të moshës 65 vjeç e lart, me ose pa sëmundje bashkëshoqëruese, në pritje të një rivlerësimi të rrezikut/përfitimit. Vaksinimi mbetet i hapur për njerëzit e moshës 18 deri në 64 vjeç me sëmundje bashkëshoqëruese.
- Më 26 mars 2025, një rast autokton i sëmundjes së virusit chikungunya u raportua në Mayotte. Që nga 24 prilli 2025, në ishull janë raportuar 17 raste autoktone të sëmundjes.

Shpërthim i C. diphtheriae ST-574 midis migrantëve, personave që jetojnë në gjendje të pastrehë, të moshuarve dhe personave të pavaksinuar - Gjermania - 2025

- Më 30 prill 2025, Gjermania raportoi një sinjal për një shpërthim difterik të shkaktuar nga lloji i sekuencës C. Diphtheriae ST-574.
- Lloji u zbulua për herë të parë në vitin 2022 si pjesë e shpërthimit ndërkombëtar të difterisë së importuar midis migrantëve të sapoardhur në Gjermani. Analizat e sekuencës sugjerojnë shfaqjen e dy nën-grupeve që prekin kryesisht grupet e popullsisë jo-migrante.
- Nën-grupi i parë përfshin të paktën 15 raste të difterisë kutane në Frankfurt/Main. Grupi i dytë përfshin të paktën 10 raste të difterisë, duke përfshirë pesë raste të difterisë kutane midis njerëzve që jetojnë pastrehë në Berlin dhe pesë raste të difterisë respiratore, duke përfshirë tre vdekje (nga një në Saksoninë e Poshtme, Brandenburg dhe Saksoni).

- Që nga fillimi i vitit 2022, dhe që nga 30 prilli 2025, ka pasur 536 raste të difterisë për shkak të *C.diphtheriae* të raportuara në BE/EEA (2022: 318 raste, 2023: 156 raste, 2024: 52 raste, 2025: 10 raste) në Rastet EpiPulse.
- Nga rastet e raportuara në Rastet EpiPulse, në vitin 2022, informacioni mbi llojin e sekuencës ishte i disponueshëm për 64 raste. Në vitin 2023, informacioni mbi llojin e sekuencës ishte i disponueshëm për dy raste. Në vitet 2024 dhe 2025, informacioni mbi llojin e sekuencës nuk ishte i disponueshëm për asnjë nga rastet e raportuara. Lloji i sekuencës (574) ishte i disponueshëm për një vdekje të raportuar në vitin 2022.
- Shpërthimi i raportuar midis migrantëve dhe vëzhgimi i të njëjtave kloneve ST në popullata të tjera është i pazakontë dhe duhet të monitorohet me kujdes së bashku me zbatimin e masave të nevojshme të shëndetit publik për të shmangur shfaqjen e më shumë rasteve dhe përhapjen e mëtejshme.
- Probabiliteti i zhvillimit të sëmundjes është shumë i ulët për individët që banojnë në komunitet, me kusht që ata të kenë përfunduar një seri të plotë vaksinimi kundër difterisë dhe të kenë një status të azhurnuar të imunizimit.
- Difteria klinike e rëndë është e mundur tek individët e pavaksinuar ose me imunitet të kompromentuar; difteria duhet të konsiderohet si një diagnozë diferenciale në rastet me prezantim klinik të pajtueshëm të sëmundjes.

Mpox për shkak të kladës I dhe II të virusit të lisë së majmunëve – Shpërthim global – 2024–2025

- Klada I dhe klada II e virusit të lisë së majmunëve (MPXV) qarkullojnë në shumë vende, me tendencat epidemiologjike që mbeten kryesisht të pandryshuara.
- Shumica e rasteve të kladës I të mpox në Afrikë ende raportohen nga Republika Demokratike e Kongos (RDK), Burundi dhe Uganda. Uganda vazhdon të tregojë një trend në rritje në rastet e raportuara.
- Raste sporadike të kladës I të mpox janë raportuar gjithashtu jashtë Afrikës muajin e kaluar pa ndonjë tregues të transmetimit në komunitetin më të gjerë jashtë kontinentit.
- ECDC po monitoron dhe vlerëson nga afër situatën epidemiologjike, dhe informacione shtesë përkatëse mund të gjenden në vlerësimin e shpejtë të rrezikut të Qendrës të publikuar më 16 gusht 2024.

Ethet e verdha – Amerika e Jugut – 2024–2025

- Nga 12 maji 2025, udhëtarët që hyjnë në Ekuador nga vendet fqinje do të duhet të paraqesin prova të vaksinimit kundër etheve të verdha.
- Më 3 shkurt 2025, Organizata Pan-Amerikane e Shëndetësisë (PAHO/OBSH) lëshoi një alarm epidemiologjik mbi një rritje të rasteve të etheve të verdha tek njerëzit të raportuara në vendet e Amerikës së Jugut.
- Amerika e Jugut është një destinacion turistik popullor për udhëtarët nga BE/EEA dhe është e rëndësishme që klinikat e mjekësisë së udhëtimit dhe qendrat e vaksinimit të jenë të vetëdijshme për rrezikun e etheve të verdha.
- Që nga viti 2005, 16 raste të importuara të etheve të verdha janë raportuar në BE/EEA. Mundësia e transmetimit të virusit në BE/EEA është shumë e ulët.

Kolera – Shumëvendëshe (Bota) – Monitorimi i shpërthimeve globale – Përditësim mujor

- Që nga 1 janari 2025 dhe deri më 2 maj 2025, janë raportuar 111 359 raste të kolerës, përfshirë 1 562 vdekje, në të gjithë botën.
- Që nga 17 marsi 2025 dhe deri më 2 maj 2025, janë raportuar 16 111 raste të reja të kolerës, përfshirë 372 vdekje të reja, në të gjithë botën.
- Raste të reja janë raportuar nga Afganistani, Angola, Bangladeshi, Burundi, Republika Demokratike e Kongos, Etiopia, Gana, Haiti, India, Kenia, Malavi, Mozambiku, Mianmari, Namibia, Nepali, Nigeria, Pakistani, Ruanda, Somalia, Sudani i Jugut, Sudani, Togo, Uganda, Republika e Bashkuar e Tanzanisë, Jemeni, Zambia dhe Zimbabve.
- Në vitin 2025, rastet e kolerës vazhdojnë të raportohen në Afrikë, Azi dhe Lindjen e Mesme. Rreziku i infeksionit me kolerë tek udhëtarët që vizitojnë këto vende mbetet i ulët, edhe pse importimi sporadik i rasteve në BE/EEA është i mundur.