



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 23

02 Qershor – 08 Qershor 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 97.2% (=35/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Berat	15 / 15	100%
Bulqizë	9 / 9	100%
Delvinë	5 / 5	100%
Devoll	6 / 6	100%
Dibër	16 / 16	100%
Durrës	20 / 20	100%
Elbasan	27 / 27	100%
Fier	20 / 20	100%
Gjirokastër	21 / 21	100%
Gramsh	7 / 8	88%
Has	5 / 5	100%
Kavajë	10 / 10	100%
Kolonjë	4 / 4	100%
Korçë	18 / 18	100%
Krujë	6 / 6	100%
Kuçovë	4 / 4	100%
Kukës	14 / 14	100%
Kurbin	5 / 5	100%
Lezhë	10 / 11	91%
Librazhd	11 / 11	100%
Lushnjë	18 / 18	100%
Malësi e Madhe	6 / 6	100%
Mallakastër	7 / 9	78%
Mat	13 / 13	100%
Mirditë	3 / 8	38%
Peqin	7 / 7	100%

Përmet	0 / 8	0%
Pogradec	9 / 9	100%
Pukë	10 / 11	91%
Sarandë	9 / 9	100%
Shkodër	19 / 19	100%
Skrapar	6 / 6	100%
Tepelenë	7 / 7	100%
Tiranë	35 / 36	97%
Tropojë	6 / 9	67%
Vlorë	21 / 21	100%
TOTAL	409 / 431	95%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 23

	JAVA 23
Diarre pa gjak	1574
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	6818
Inf. Resp. te poshtëme	3062
Rash me temperaturë	40
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	409
% e Njësive Raportuese	95% (409/431)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Fier – 4 raste

Kavaje– 8 raste

Tiranë – 18 raste


Kurbin – 1 rast

Mat – 2 rast


Pogradec – 2 raste

Vlore – 5 raste

Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 23 krahasuar me javën paraardhëse, java 22

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 23 krahasuar me javën paraardhëse, java 22.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 - 23 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 23 të vitit 2025 vërehet një ulje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 22 dhe 23/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 01 – 23 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 23 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i larte i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 22 dhe 23/ 2025. Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje kombëtare

Rast me brucelozë – Shtiqen, Kukës

Rasti i datëlindjes 17.04.1970, mashkull, banor në Shtiqen të Kukësit pas një temperature të zgjatur dhe të pa shpjegueshme u referua nga mjekja e spitalit si i dyshuar për bruceloze dhe u testua pranë laboratorit në NJVKSH Kukës me metodën Roze-Bengal. Rasti rezultoi pozitiv me brucelozë.

Nga ana e shërbimit të epidemiologjisë u krye hetimi i rastit. Pacienti kishte temperaturë prej 2 javësh , djersitje të shtuar , dobësi të përgjithshme me e lokalizuar ne gjymtyrë. Rasti nuk kishte lëvizur jashtë shtetit, nuk konsumonte dreka apo darka jashtë ambientit familjar . Aktualisht është i shtruar pranë spitalit infektiv QSUT, diagnoza është konfirmuar në Laboratorin e ISHP.

Familja përbëhej nga 3 anëtarë dhe u krye depistim i familjarëve, ku rezultuan pozitiv bashkëshortja dhe djali i tij. Të dy kontaktet nuk kanë shenja klinike dhe janë në monitorim të vazhdueshëm.

Pacienti ishte nje fermer i cili kishte 100 dele dhe 5 lopë, ushqimet blegtorale si qumësht, djathë gjalp, mish i konsumonte nga prodhimet e veta. U njoftua menjëhere shërbimi i veterinarisë dhe drejtoria AKU për marrjen e masave dhe hetimin e rastit sipas protokolleve të tyre. Nga shërbimi i veterinarisë rezulton se delet janë të vaksinuara, ndërsa nga testimi i lopëve të pavaksinuara 3 rezultuan pozitiv me brucelozë. Shërbimi veterinar ka marrë masat e kontrollit bazuar në protokollin e përcaktuar.

Ngjarje ndërkombëtare

Shpërthim i Salmonella Infantis tek fëmijët e vegjël në Gjermani dhe Austri

- Një shpërthim i Salmonella Infantis që prek kryesisht fëmijët e vegjël është raportuar nga Gjermania (52 raste, përfshirë 21 të konfirmuara nga WGS) dhe Austria (13 raste të konfirmuara nga WGS). Datat e njohura të fillimit të simptomave kanë qenë midis 31 marsit dhe 20 majit 2025.
- Izolatet e rasteve të konfirmuara në Austri dhe Gjermani janë gjenetikisht të lidhura ngushtë.
- Produkti ushqimor i dyshuar është musi i gatshëm për t'u ngrënë me arra kaju, i cili është shpërndarë në Austri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Çeki, Gjermani, Hungari, Itali, Poloni, Sllovaki dhe Slloveni.
- Produkti është tërhequr nga tregu, por ka një afat të gjatë ruajtjeje, kështu që mund të ndodhin më shumë raste.

Ethet hemorragjike Krime-Kongo, Spanjë 2025

- Spanja raportoi rastin e parë të konfirmuar të etheve hemorragjike Krime-Kongo (CCHF) në vitin 2025 në bashkësinë autonome të Kastiljes dhe Leonit.
- Pacienti u kafshua nga një rriqnë më 25 maj në një fshat në provincën e Salamankës dhe zhvilloi simptoma (ethe, dhimbje koke dhe të vjella) dy ditë më vonë. Rasti u pranua në një spital më 27 maj dhe rezultoi pozitiv për ARN-në e virusit CCHF me anë të PCR.
- Rastet e CCHF janë raportuar në të njëjtën zonë në vitet e mëparshme.

Sëmundja autoktone e shkaktuar nga virusi chikungunya – Réunion dhe Mayotte, Francë, 2024–2025

- Në gusht 2024, Franca raportoi rastin e parë autoktone të sëmundjes së virusit chikungunya në 10 vjet në Réunion, me fillimin e simptomave më 12 gusht. Një rënie në treguesit e survejances (vizitat e kujdesit parësor dhe vizitat në departamentin e urgjencës për sëmundjen e shkaktuar nga virusi chikungunya) është vërejtur që nga java e 17-të.
- Që nga fillimi i vitit, dhe që nga 4 qershori 2025, afër 53 000 raste të konfirmuara autoktone të sëmundjes së virusit chikungunya janë raportuar në Réunion. Që nga fillimi i shpërthimit, 20 vdekje tek njerëzit mbi 64 vjeç me sëmundje komorbiditete dhe tek dy fëmijë nën moshën gjashtë muajsh u klasifikuan si të lidhura me sëmundjen e virusit chikungunya.
- Autoriteti i Lartë i Shëndetit (HAS) ka këshilluar vendimmarrësit publikë që të vaksinojnë grupet që janë në rrezik më të lartë për sëmundje të rënda dhe profesionistë të kontrollit të vektorëve. Agjencia rajonale e shëndetit filloi një fushatë vaksinimi për individët me përparësi më 7 prill.
- Më 26 prill 2025, Ministria Franceze e Shëndetësisë dhe Qasjes në Kujdes raportoi tre ngjarje serioze të padëshiruara pas vaksinimit kundër chikungunya me vaksinën Ixchik në Réunion, përfshirë një vdekje. Si rezultat, autoritetet shëndetësore pezulluan vaksinimin e personave mbi 65 vjeç, me ose pa sëmundje bashkëshoqëruese, në pritje të një rivlerësimi të rrezikut/përfitimit. Vaksinimi mbetet i hapur për personat e moshës 18-64 vjeç me sëmundje bashkëshoqëruese.
- Më 7 maj 2025, Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) deklaroi se komiteti i sigurisë i agjencisë (PRAC) kishte filluar një shqyrtim të vaksinës Ixchik pas raporteve të ngjarjeve serioze të padëshiruara tek të rriturit e moshuar. Si masë e përkohshme, ndërsa një shqyrtim i thelluar është në vazhdim, Ixchik nuk duhet të përdoret tek të rriturit e moshës 65 vjeç e lart.
- Më 26 mars 2025, një rast autokton i sëmundjes së virusit chikungunya u raportua në Mayotte. Që nga 2 qershori 2025, 560 raste të konfirmuara të sëmundjes janë raportuar në

ishull. Për shkak të qarkullimit të intensifikuar të rasteve të fituara në vend të chikungunya, plani i ORSEC ka kaluar në fazën 3 për të kontrolluar shpërthimin dhe për t'u përgatitur më mirë për një fazë të mundshme epidemike.

Monitorimi i tubimeve masive - Haxh - Mbretëria e Arabisë Saudite - 2025

- Që nga 5 qershori 2025, nuk janë zbuluar ngjarje relevante të shëndetit publik që lidhen me sëmundjet ngjitëse në lidhje me pelegrinazhin vjetor islamik të Haxhit.
- ECDC po monitoron këtë ngjarje përmes inteligjencës së saj epidemike për aktivitetet e tubimeve masive midis 26 majit dhe 13 qershorit 2025 në bashkëpunim me CDC-në.
- Mundësia e infektimit me sëmundje ngjitëse dhe ndikimi për qytetarët e BE-së/EEA-së gjatë Haxhit konsiderohen të ulëta nëse ndiqen rekomandimet e shëndetit publik. Ndikimi dhe rreziku i përgjithshëm konsiderohen të moderuar për njerëzit me sëmundje themelore, të moshuarit dhe gratë shtatzëna.

Gripi A(H5N1) – Monitorimi i rasteve në njerëz

- Më 28 maj 2025, një rast i ri fatal njerëzor me infeksion të gripit të shpendëve A(H5N1) u raportua tek një fëmijë në Kamboxhia.
- Hetimi zbuloi se kishte zogj të sëmurë dhe që po vdisnin në oborrin e shtëpisë së fëmijës një javë para sëmundjes së tyre.
- Hetimet nuk zbuluan raste të transmetimit nga njeriu te njeriu rreth këtij rasti.
- Vlerësimi i rrezikut i ECDC për A(H5N1) mbetet i pandryshuar.
- Që nga viti 2003, dhe që nga 2 qershori 2025, ka pasur 976 raste njerëzore të A(H5N1) në të gjithë botën, përfshirë 471 vdekje.