



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 25
16 Qershor – 22 Qershor 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	8 / 10	80%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	5 / 6	83%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	14 / 15	93%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	10 / 11	91%
	Kukës	Kukës	13 / 14	93%
		Has	5 / 5	100%

	Lezhë	Tropojë	6 / 9	67%
		Lezhë	11 / 11	100%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	6 / 6	100%
VLORE	Vlorë	Vlorë	20 / 21	95%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	418 / 429	97%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 25

	JAVA 25
Diarre pa gjak	1879
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	6282
Inf. Resp. te poshtëme	2339
Rash me temperaturë	44
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	418
% e Njësive Raportuese	97% (418/429)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Fier – 8 raste

Kavaje– 4 raste


Tiranë – 20 raste

Kurbin – 1 rast


Pogradec – 8 raste

Vlore– 3 raste

Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 25 krahasuar me javën paraardhëse, java 24

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 25 krahasuar me javën paraardhëse, java 24.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 - 25 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 25 të vitit 2025 vërehet një ulje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 24 dhe 25/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 25 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 25 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i ulët i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 24 dhe 25/ 2025. Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje ndërkombëtare

Lia e majmunit (Mpox) në BE/EEA, vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi – 2022–2025

- Që nga përditësimi i fundit më 19 maj 2025, dhe që nga 19 qershori 2025, janë raportuar 81 raste mpox nga 14 vende të BE/EEA: Gjermania (29), Franca (14), Spanja (8), Italia (7), Holanda (7), Portugalia (4), Austria (2), Çekia (2), Malta (2), Polonia (2), Belgjika (1), Irlanda (1), Luksemburgu (1) dhe Suedia (1). Që nga 19 maji 2025, asnjë vend i ri nuk ka raportuar raste të konfirmuara.
- Që nga 19 maji 2025, dy vende të reja të Ballkanit Perëndimor kanë raportuar raste të konfirmuara (Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria).
- Që nga fillimi i shpërthimit të mpox dhe që nga 19 qershori 2025, janë raportuar 24 772 raste të konfirmuara të mpox (MPX) nga 29 vende të BE/EEA.
- Njëzet e dy raste të kladës I të MPXV janë raportuar në BE/EEA që nga gushti 2024, nga Suedia, Gjermania, Belgjika, Irlanda, Italia dhe Franca. Të gjitha ishin të kladës Ib, përveç rastit në Irlandë, i cili ishte i kladës Ia.
- Rreziku i përgjithshëm mbetet i ulët për burrat që kryejnë marrëdhënie seksuale me burra dhe i ulët për popullsinë më të gjerë të BE/EEA. Megjithatë, ndërsa fillojnë udhëtimet verore, transmetimi mund të rritet dhe është e rëndësishme të rritet ndërgjegjësimi midis burrave që kryejnë marrëdhënie seksuale me burra në kontekstin e mesazheve të përgjithshme mbi infeksionet seksualisht të transmetueshme.

Shpërthim i Hepatitit A, kryesisht i lidhur me transmetimin seksual midis MSM, në Portugali

- MSM që marrin pjesë në EuroPride 2025 Lisbonë në Portugali 14-22 qershor 2025 dhe që angazhohen në aktivitet seksual mund të jenë të ekspozuar ndaj infeksionit të virusit të hepatitit A (HAV) së bashku me infeksione të tjera të transmetuara përmes seksit, me një probabilitet më të lartë të infeksionit për ata me partnerë të shumtë dhe ata që nuk marrin masa paraprake
- Ekziston një shpërthim i vazhdueshëm i hepatitit A në Portugali që u zbulua më 28 shkurt 2024, gjenotipi IA, lloji VRD_521_2016, një nga llojet që qarkullojnë në Evropë gjatë shpërthimit 2017-2018 tek MSM. Një numër në rritje rastesh është zbuluar që nga nëntori 2024. Midis 1 janarit dhe 31 majit 2025, janë raportuar 122 raste në kontekstin e transmetimit përmes kontaktit seksual.
- Vaksinimi para ekspozimit rekomandohet fuqimisht për ata që marrin pjesë në event.
- MSM-të inkurajohen të kontaktojnë një ofrues kujdesi shëndetësor në shtëpi nëse mendojnë se janë ekspozuar ndaj patogjenëve seksualisht të transmetueshëm, përfshirë HAV-në. Vaksinimi pas ekspozimit mund të jepet brenda dy javësh, por është më efektiv sa më herët të jepet.

- Shtetet Anëtare duhet të jenë gjithashtu të vetëdijshme për MSM-të që kthehen nga ngjarjet e Pride-it me infeksion të hepatitit A dhe të marrin në konsideratë rritjen e ndërgjegjësimit midis mjekëve dhe profesionistëve të laboratorit në përputhje me rrethanat.

Monitorimi i tubimeve masive – EuroPride 2025 Lisbonë - Portugali – 2025

- Që nga 19 qershori 2025, nuk janë zbuluar ngjarje relevante të shëndetit publik që lidhen me sëmundjet ngjitëse në lidhje me EuroPride 2025 Lisbonë.
- ECDC po monitoron këtë ngjarje përmes inteligjencës së saj epidemike për aktivitetet e tubimeve masive midis 9 dhe 27 qershorit 2025 në bashkëpunim me autoritetet shëndetësore portugeze dhe Zyrën Rajonale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën (OBSh/Evropë), dhe po përfshin përditësime javore në Raportin e Kërcënimeve të Sëmundjeve Ngjitëse (CDTR).
- Infeksionet seksualisht të transmetueshme (IST), HIV dhe hepatiti, si dhe mpox dhe shigella, tashmë po përhapen në rrjetet e burrave që kryejnë marrëdhënie seksuale me burra (MSM) në Evropë, duke përfshirë një shpërthim të vazhdueshëm të hepatitit A midis MSM në Portugali. Probabiliteti i infektimit me IST dhe infeksione të tjera që përhapen përmes seksit është i lartë për njerëzit që marrin pjesë në EuroPride 2025 Lisbonë dhe kryejnë marrëdhënie seksuale me partnerë të paqëndrueshëm dhe të shumtë, veçanërisht nëse masat parandaluese nuk zbatohen në mënyrë të vazhdueshme.

Survejanca sezonale e sëmundjes së virusit chikungunya – 2025

- Ky është raporti i parë i survejancës javore sezonale të sëmundjes së virusit chikungunya në vitin 2025.
- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 18 qershori 2025, Franca ka raportuar dy raste të sëmundjes së virusit chikungunya të fituar në nivel lokal.

Sëmundja autoktone e virusit chikungunya – Réunion dhe Mayotte, Francë, 2024–2025

- Në gusht 2024, Franca raportoi rastin e parë autoktone të sëmundjes së virusit chikungunya në 10 vjet në Réunion, me fillimin e simptomave më 12 gusht. Një rënie në treguesit e survejancës (vizitat e kujdesit parësor dhe vizitat në departamentin e urgjencës për sëmundjen e virusit chikungunya) është vërejtur që nga java e 17-të.
- Që nga fillimi i vitit, dhe që nga 15 qershori 2025, më shumë se 54 000 raste të konfirmuara autoktone të sëmundjes së virusit chikungunya janë raportuar në Réunion. Që nga fillimi i shpërthimit, 23 vdekje, kryesisht në njerëz të moshës mbi 64 vjeç, janë klasifikuar si të lidhura me sëmundjen e virusit chikungunya.

- Autoriteti i Lartë i Shëndetësisë (HAS) ka këshilluar vendimmarrësit publikë të vaksinojnë grupet që janë në rrezik më të lartë për sëmundje të rënda dhe profesionistët e kontrollit të vektorëve. Agjencia rajonale e shëndetit filloi një fushatë vaksinimi për individët me përparësi më 7 prill.
- Më 26 prill 2025, Ministria Franceze e Shëndetësisë dhe Qasjes në Kujdes raportoi tre ngjarje të rënda anësore pas vaksinimit kundër chikungunya me vaksinën Ixchiq në Reunion, përfshirë një vdekje. Si rezultat, autoritetet shëndetësore pezulluan vaksinimin e personave mbi 65 vjeç, me ose pa sëmundje bashkëshoqëruese, në pritje të një rivlerësimi të raportit rrezik/përfitim. Vaksinimi mbetet i hapur për personat e moshës 18-64 vjeç me sëmundje bashkëshoqëruese.
- Më 7 maj 2025, Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) deklaroi se komiteti i sigurisë i agjencisë (PRAC) kishte filluar një shqyrtim të vaksinës Ixchiq pas raporteve të ngjarjeve të rënda anësore tek të rriturit e moshuar. Si një masë e përkohshme, ndërsa një shqyrtim i thelluar është duke vazhduar, Ixchiq nuk duhet të përdoret për të rriturit e moshës 65 vjeç e lart.
- Më 26 mars 2025, një rast autokton i sëmundjes së virusit chikungunya u raportua në Mayotte. Që nga 8 qershori 2025, 882 raste të konfirmuara të sëmundjes janë raportuar në ishull. Për shkak të qarkullimit të intensifikuar të rasteve të fituara në vend të chikungunya-s, plani i ORSEC ka kaluar në fazën 3 për të kontrolluar shpërthimin dhe për t'u përgatitur më mirë për një fazë të mundshme epidemike.

Gripi A(H5N1) – Shumëvendësh (Botë) – Monitorimi i rasteve në njerëz

- Një rast i ri në njerëz me infeksion të gripit të shpendëve A(H5N1) u raportua tek një i rritur 65-vjeçar në Kamboxhia në një njoftim për shtyp nga Ministria e Shëndetësisë e Kamboxhias më 13 qershor 2025.
- Pacienti kishte ekspozim ndaj shpendëve të oborrit, megjithëse nuk u zbuluan zogj të sëmurë ose të ngordhur në fshatin nga i cili vjen rasti.
- Në kohën e këtij raporti nuk kishte raste të zbuluara dhe/ose të raportuara të transmetimit nga njeriu te njeriu rreth këtij rasti.
- Vlerësimi i rrezikut i ECDC për A(H5N1) mbetet i pandryshuar.
- Që nga viti 2003, dhe që nga 16 qershori 2025, ka pasur 979 raste njerëzore të A(H5N1) në të gjithë botën, duke përfshirë 471 vdekje.