



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 27

30 Qershor – 06 Korrik 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 97.2% (=35/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	9 / 10	90%
	Durrës	Durrës	19 / 20	95%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	10 / 11	91%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	11 / 11	100%
	Kukës	Kukës	13 / 14	93%
		Has	5 / 5	100%

VLOREË	Lezhë	Tropojë	5 / 9	56%
		Lezhë	10 / 11	91%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	5 / 6	83%
	Vlorë	Vlorë	20 / 21	95%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	0 / 9	0%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	6 / 7	86%
		TOTAL	407 / 429	95%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 27

	JAVA 27
Diarre pa gjak	2092
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	5444
Inf. Resp. te poshtëme	1999
Rash me temperaturë	20
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	407
% e Njësive Raportuese	95% (407/429)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Fier – 1 rast


Pogradec – 1 rast

Kurbin – 1 rast


Tiranë – 4 raste

Vlorë– 3 raste

Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 27 krahasuar me javën paraardhëse, java 26

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 27 krahasuar me javën paraardhëse, java 26.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 - 2 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 27 të vitit 2025 vërehet një ulje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 26 dhe 27/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 27 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 27 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i ulët i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 26 dhe 27/ 2025.
Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje ndërkombëtare

Gripi A(H5N1) – Shumëvendësh (Botë) – Monitorimi i rasteve tek njerëzit

- Më 3 korrik 2025, Ministria e Shëndetësisë e Kamboxhias raportoi një rast tek njerëzit me infeksion nga virusi i gripit të shpendëve A(H5N1) tek një djalë pesëvjeçar nga Provinca Kampot. Pacienti aktualisht po merr kujdes intensiv mjekësor.
- Rasti kishte pasur ekspozim të njohur ndaj shpendëve të sëmurë ose të ngordhur para fillimit të simptomave.
- Hetimi i shpërthimit, gjurmimi i kontakteve dhe masat parandaluese janë duke vazhduar.
- Vlerësimi i rrezikut të ECDC për A(H5N1) mbetet i pandryshuar.
- Që nga viti 2003 dhe që nga 3 korriku 2025, ka pasur 985 raste të konfirmuara tek njerëzit me A(H5N1) në të gjithë botën, përfshirë 473 vdekje.

Koronavirusi i sindromës respiratore të Lindjes së Mesme (MERS-CoV) –Përditësim mujor

- Që nga përditësimi i mëparshëm më 3 qershor 2025, dhe që nga 2 korriku 2025, nuk janë raportuar raste të reja të MERS nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh) ose autoritetet kombëtare shëndetësore.
- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 2 korriku 2025, 10 raste të MERS, përfshirë dy vdekje, janë raportuar me datë fillimi në vitin 2025 në Arabinë Saudite.
- Rreziku i transmetimit të qëndrueshëm nga njeriu te njeriu në Evropë mbetet shumë i ulët, dhe situata aktuale e MERS-CoV paraqet një rrezik të ulët për BE/EEA-në.

Poliovirusi i tipit 2 i derivuar nga vaksina (cVDPV2) në qarkullim –2024–25

- Një grumbull gjenetik i polioviruseve të tipit 2 të derivuar nga vaksina (cVDPV2) është zbuluar nga mostrat e ujërave të zeza të mbledhura në Evropë (Mbretëria e Bashkuar (MB), Finlanda, Gjermania, Spanja dhe Polonia) gjatë vitit 2024 dhe fillimit të vitit 2025.
- Gjermania ka raportuar zbulime të reja të cVDPV2 në mostra të shumta mjedisore në vitin 2025.
- Grumbullimi tregon një shkallë të diversitetit gjenomik që mbështet më mirë hipotezën e futjeve të shumëfishta sesa një hyrje të vetme me transmetim lokal brenda BE-së. Megjithatë, përhapja e madhe gjeografike në BE/EEA, fakti që zbulimet ndodhën gjatë disa muajve dhe identifikimi i nën-grupeve specifike gjenetike sugjerojnë të paktën një shkallë të transmetimit lokal.
- Nuk janë raportuar raste të poliomielitit.

- Autoritetet e shëndetit publik në këto vende kanë intensifikuar mbikëqyrjen dhe përpjekjet për të ofruar vaksinime të rekomanduara kundër poliovirusit në përputhje me oraret kombëtare.
- Duke pasur parasysh praninë e grupeve të popullsisë së pavaksinuar ose të pavaksinuar në vendet evropiane, dhe faktin që poliomeliti nuk është zhdukur globalisht, rreziku i rikthimit të virusit në Evropë mbetet.

Survejanca sezonale e etheve hemorragjike Krime-Kongo – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe që nga 2 korriku 2025, dy vende në Evropë raportuan raste të ethes hemorragjike Krime-Kongo (CCHF): Greqia (2) dhe Spanja (1).
- Greqia raportoi një rast dytësor të një profesionist i kujdesit shëndetësor i cili ofroi kujdes për pacientin ku ndodhi rasti parësor.

Survejanca javore sezonale e infeksionit të virusit të Nilit Perëndimor – 2025

- Që nga fillimi i sezonit të transmetimit të vitit 2025, dhe që nga 2 korriku 2025, asnjë vend në Evropë nuk ka raportuar raste njerëzore të infeksionit të virusit të Nilit Perëndimor (WNV).

Survejanca sezonale e sëmundjes së virusit chikungunya – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 2 korriku 2025, Franca është i vetmi vend në Evropë që ka raportuar raste të sëmundjes së virusit chikungunya (14 raste në shtatë grupe).