



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 32

04 Gusht – 10 Gusht 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Perqindja e plotesueshmerise				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	8 / 10	80%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	10 / 11	91%
	Kukës	Kukës	11 / 14	79%

		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	7 / 9	78%
	Lezhë	Lezhë	11 / 11	100%
		Kurbin	4 / 5	80%
		Mirditë	4 / 6	67%
VLORE	Vlorë	Vlorë	21 / 21	100%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	5 / 9	56%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	413 / 429	96%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 32

	JAVA 32
Diarre pa gjak	4217
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	6996
Inf. Resp. te poshtëme	2086
Rash me temperaturë	15
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	413
% e Njësive Raportuese	96% (413/429)



Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Tiranë – 12 raste


Kruje – 1 rast

Fier – 2 rast


Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën 32 krahasuar me javën paraardhëse, java 31

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 32 krahasuar me javën paraardhëse, java 31.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 32 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 32 të vitit 2025 vërehet një rritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 31 dhe 32/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarrëve pa Gjak” në javët 10 – 32 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 32 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i madh i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 31 dhe 32/ 2025. Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje kombetare

Infeksioni nga virusi i Nilit Perendimor- Situata epidemiologjike ne vendin tone

Gjatë vitit 2025 në Shqipëri janë testuar 48 persona për WNV ku vetëm gjatë muajve Qershor - Gusht 2025 janë testuar 38 raste (79%) të dyshuar për WNV.

Gjatë periudhës Qershor – 8 Gusht 2025, nga 38 rastet e testuara, vetëm 2 raste janë konfirmuar nëpërmjet serologjisë të dyfishtë dhe PCR ndërsa 1 rast është i mundshëm duke paraqitur vetëm një rezultat pozitiv serologjik ndërsa 35 raste mbeten raste të dyshuara për shkak të shenjave klinike.

ISHP udhëzon që cdo rast të dokumentohet qartë në lidhje me detajet e vendbanimit në sistemin online të survejancës të sëmundjeve infektive apo të dhënat e tjera pasi vetëm në këtë mënyrë mund të bëhet një hetim entomologjik i mëtijshëm dhe të merren masat përkatëse të kontrollit të vektorëve me larvicide dhe adulticide.

Ngjarje ndërkombëtare

Survejanca sezonale e Dengues – 2025

Që nga fillimi i vitit 2025 dhe që nga 6 gushti 2025, tre vende në Evropë kanë raportuar raste të dengues: Franca (10), Italia (tre) dhe Portugalia (dy).

Këtë javë, Franca raportoi katër raste të reja të dengues të fituara në nivel lokal në grupe të raportuara më parë: tre në Bouches-du-Rhône dhe një në departamentin Ain. Italia dhe Portugalia nuk raportuan asnjë rast të ri këtë javë.

Dy rastet e raportuara në janar në Madeira, një rajon më i largët i Portugalisë, ndoshta janë transmetuar në vitin 2024.

Survejanca sezonale e sëmundjes së virusit chikungunya - 2025

Që nga fillimi i vitit 2025 dhe që nga 6 gushti 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të sëmundjes së virusit chikungunya: Franca (63) dhe Italia (dy).

Autoritetet e shëndetit publik në Francë kanë raportuar 63 raste të sëmundjes së virusit chikungunya të fituar në vend në 16 njësi të ndryshme administrative lokale. Krahësuar me javën e 31-të, numri i klastereve u rrit me dy në javën e 32-të.

Rastet u raportuan për herë të parë në departamentin Pyrenees-Atlantiques (tre raste në një klaster). Tre raste që përfaqësojnë një klaster të ri u raportuan në Gard. Dy raste të reja u raportuan në secilin prej klasterëve aktive në departamentet Corse-du-Sud, Isère, Hérault dhe Bouches-du-Rhône. Njëmbëdhjetë klasterë klasifikohen aktualisht si aktive. Grumbujt më të mëdhenj ndodhen në Salon-de-Provence, Grans dhe Lambesc në departamentin Bouches-du-Rhône dhe Grosseto-Prugna në departamentin Corse-du-Sud, dhe të dy përbëhen nga 13 raste.

Këtë javë Italia nuk raportoi asnjë rast të ri të sëmundjes së virusit chikungunya të fituar në vend. Të dy grumbujt me nga një rast në secilin mbeten aktivë.

Survejanca sezonale e etheve hemorragjike Krime-Kongo – 2025

Që nga fillimi i vitit 2025 dhe që nga 6 gushti 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të etheve hemorragjike Krime-Kongo (CCHF): Spanja (tre) dhe Greqia (dy).

Këtë javë Spanja raportoi një rast të ri të CCHF të fituar në vend në provincën e Toledos. Rastet në Greqi që ndodhën në rajonin e Thesalisë janë të papritura, pasi ky rajon dhe rajonet fqinje nuk kanë raportuar më parë raste të CCHF ose qarkullim të virusit CCHF në kafshë. Rasti primar ndoshta ishte infektuar përmes një pickimi rriqre, ndërsa rasti sekondar ishte tek një profesionist i kujdesit shëndetësor që ofroi kujdes për rastin primar. Këto janë rastet e para që nga viti 2008 kur i vetmi rast i fituar në vend i raportuar nga Greqia deri më sot u gjet në rajonin e Trakisë (në kufi me Bullgarinë).

Rastet në Spanjë nuk janë të papritura, pasi dihet që virusi CCHF qarkullon midis kafshëve në provincën e Salamancës, rajonin e Castile dhe León, dhe provincën e Toledos, rajonin e Castilla-La Mancha, dhe rastet e CCHF tek njerëzit janë raportuar më parë në të dyja zonat.

Vlerësimi i ECDC

Nga viti 2016 deri në vitin 2024, në Spanjë janë raportuar gjithsej 16 raste autoktone të CCHF, me datat e fillimit të sëmundjes midis prillit dhe gushtit. Provinca e Salamancës është një vatër e nxehtë për CCHF, me 50% të rasteve që janë të ekspozuara ndaj rriqrave. Dy raste janë zbuluar më parë në të njëjtin lokalitet si rasti aktual. Në këtë zonë, prania e *Hyalomma marginatum*, vektori kryesor i kësaj sëmundjeje, është e njohur mirë, dhe studimet e kryera në kafshë të egra dhe shtëpiake kanë treguar seroprevalencë më të lartë se 70% për virusin CCHF. Një rast me CCHF në provincën e Toledos u raportua në vitin 2024. Ngjarjet aktuale, pra, nuk janë të papritura.

Edhe pse rreziku i infektimit me CCHF për popullatën e përgjithshme në zonat ku dihet se virusi është i pranishëm në Spanjë është i ulët, ky rrezik rritet në mënyrë drastike për njerëzit që kryejnë aktivitete që i ekspozojnë ata ndaj pickimeve të rriqnave (p.sh. gjuetia, puna në pylltari, ecja në natyrë,

mbikëqyrja e kafshëve). Si një masë paraprake e përgjithshme kundër CCHF, por edhe kundër sëmundjeve të tjera të transmetuara nga rriqnat, njerëzit që mund të jenë të ekspozuar ndaj rriqnave duhet të zbatojnë masa mbrojtëse personale kundër pickimeve të rriqrave (Masat Mbrojtëse të ECDC kundër rriqnave). Rriqnat nga *Hyalomma* spp. konsiderohen si vektorët kryesorë të virusit CCHF. *Hyalomma marginatum* është gjerësisht i pranishëm në Evropën Jugore dhe Lindore. Një vektor tjetër është *Hyalomma lusitanicum*, i cili është i pranishëm në pjesë të Evropës Jugore. Transmetimi i lidhur me kujdesin shëndetësor, i cili nuk është i ndërmjetësuar nga rriqnat, është gjithashtu i dokumentuar dhe më shpesh vjen pas kontaktit perkutan ose kontaktit tjetër të lëkurës me gjakun ose lëngjet trupore të pacientit, por mund të ndodhë edhe pas afërsisë së ngushtë dhe të pambrojtur ose kontaktit me sipërfaqe të kontaminuara.

Survejanca javore sezonale e infeksionit nga virusi i Nilit Perëndimor – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe që nga 6 gushti 2025, gjashtë vende në Evropë kanë raportuar raste njerëzore të infeksionit nga virusi i Nilit Perëndimor: Bullgaria, Franca, Greqia, Hungaria, Italia dhe Rumania.

Monitorimi i tubimeve masive – Jubileu i vitit 2025 në Itali

- ECDC ka kryer monitorim të zgjeruar të Jubileut përmes aktiviteteve të saj të inteligjencës epidemike midis 21 korrikut dhe 8 gushtit 2025, me rastin e Jubileut të Rinisë.
- Që nga fillimi i mbikëqyrjes, dhe që nga 7 gushti 2025, Instituti Kombëtar Italian i Shëndetit ka raportuar 173 raste të konfirmuara të infeksionit nga virusi i Nilit Perëndimor, duke përfshirë 11 vdekje. Rajoni i Lazios përbënte 104 raste dhe katër vdekje.
- Ekipi i inteligjencës epidemike i ECDC-së vlerëson bashkëpunimin e shkëlqyer me Institutin Kombëtar Italian të Shëndetit (Istituto Superiore di Sanita' - ISS), Ministrinë Italiane të Shëndetësisë, SERESMI (Instituti Kombëtar për Sëmundjet Infektive 'L.Spallanzani' – Rajoni i Lazios) dhe partnerë të tjerë.

Fruthi –Monitorimi i shpërthimeve evropiane – monitorim mujor

- Në qershor 2025, 587 raste të fruthit u raportuan nga 15 vende në BE/EEA. Njëmbëdhjetë vende raportuan zero raste.
- Në përgjithësi, gjashtë vdekje të lidhura me fruthin janë raportuar në BE/EEA në vitin 2025, dy nga Franca, një nga Holanda dhe tre nga Rumania.
- Në përgjithësi, numri i rasteve ka rënë krahasuar me muajin e kaluar; kjo është në përputhje me sezonalitetin e fruthit.

Koronavirusi i sindromës respiratore të Lindjes së Mesme (MERS-CoV) –Përditësim mujor

- Që nga përditësimi i mëparshëm më 2 korrik 2025, dhe që nga 5 gushti 2025, një rast i ri është raportuar në Arabinë Saudite nga Rajoni i Mesdheut Lindor i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH EMRO), me datë fillimi në maj 2025.
- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 5 gushti 2025, 11 raste MERS janë raportuar në Arabinë Saudite, me datë fillimi në vitin 2025, duke përfshirë dy vdekje.
- Probabiliteti i transmetimit të qëndrueshëm nga njeriu te njeriu midis popullatës së përgjithshme në Evropë mbetet shumë i ulët dhe ndikimi i sëmundjes në popullatën e përgjithshme konsiderohet i ulët. Situata aktuale e MERSCoV paraqet një rrezik të ulët për BE/EEA-në.

Infeksioni Vibrio jo-kolerae - Poloni - 2025

- Autoriteti Kombëtar i Shëndetit Publik Polak komunikoi rezultatet laboratorike të testit të dytë konfirmues për rastin e dyshuar të kolerës në Voivodeshipin Perëndimor Pomeranez. Ai tregoi se patogjeni është V. cholerae jo-O1 dhe jo-O-139, dhe i mungon enterotoksina. Ky është i njëjti rezultat si testi i parë i mostrës.
- Në Poloni, shfaqja e vibrios jo-toksinuese në rezervuarët e ujit është vërejtur periodikisht për shumë vite. Kur rruga e infeksionit është nëpërmjet ushqimit ose ujit, simptomatologjia është zakonisht e lehtë. Prandaj, ndikimi për popullatën e përgjithshme konsiderohet i ulët.
- Çdo verë, ECDC monitoron kushtet mjedisore që favorizojnë rritjen e Vibrios në Detin Baltik dhe publikon përditësime të rregullta përmes Raportit të Kërcënimit të Sëmundjeve Ngjitëse dhe Vibrio Map Viewer

Sëmundja e virusit Nipah – India – 2025

- Më 20 korrik 2025, autoritetet shëndetësore indiane raportuan gjithsej dy raste të sëmundjes së virusit Nipah (NiV) në distriktin Palakkad, në shtetin e Kerala. Kontakti i ngushtë i një rasti të raportuar më parë, i cili rezultoi pozitiv për NiV në testimin paraprak spitalor, u konfirmua si negativ ndaj NiV pas një testi konfirmues në Institutin e Virologjisë në Pune.
- Në vitin 2025, shteti i Kerala ka raportuar gjithsej katër raste të sëmundjes NiV, në distriktet Malappuram (2) dhe Palakkad (2), përfshirë dy vdekje.
- Mundësia e ekspozimit dhe infeksionit me NiV për qytetarët e BE/EEA që udhëtojnë ose banojnë në Indi është aktualisht shumë e ulët, duke pasur parasysh numrin e ulët të infeksioneve në zonat ku janë identifikuar raste deri më sot.