



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 33
11 Gusht – 17 Gusht 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 97.2% (=35/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Perqindja e plotesueshmerise				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	6 / 10	60%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	11 / 11	100%
	Kukës	Kukës	14 / 14	100%

		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	5 / 9	56%
	Lezhë	Lezhë	10 / 11	91%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	4 / 6	67%
VLORE	Vlorë	Vlorë	20 / 21	95%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	0 / 9	0%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	407 / 429	95%



Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 33

	JAVA 33
Diarre pa gjak	4520
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	6149
Inf. Resp. te poshtëme	2168
Rash me temperaturë	11
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	407
% e Njësive Raportuese	95% (407/429)



Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Tiranë – 11 raste


Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 33 krahasuar me javën paraardhëse, java 32

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve**Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave**


Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 33 krahasuar me javën paraardhëse, java 32.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 33 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 32 të vitit 2025 vërehet një ulje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 32 dhe 33/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 33 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 33 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i ulet i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 32 dhe 33/ 2025.
Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje ndërkombëtare

Survejanca sezonale e sëmundjes së virusit chikungunya - 2025

Që nga fillimi i vitit 2025 dhe që nga 13 gushti 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të sëmundjes së virusit chikungunya: Franca (111) dhe Italia (shtatë).

Deri më tani, Franca ka raportuar 111 raste të chikungunya-s së fituar në nivel lokal në 22 grupe të ndryshme. Krahasuar me javën 32, numri i rasteve u rrit me 48 raste dhe numri i grupeve u rrit me gjashtë në javën 33. Rastet u raportuan për herë të parë këtë sezon në Charente (pesë raste në një grup), Côte-d'Or (një rast në një grup),

dhe Haute-Corse (dy raste në një grup). Dy raste të reja u raportuan në dy grupe të reja në Alpes-Maritime dhe një rast i ri në një grup të ri në Isère. Gjashtëmbëdhjetë grupe aktualisht klasifikohen si aktive. Grumbullimet më të mëdha janë të vendosura në Vitrolles (Bouches-du-Rhône, n=23), me një rritje prej 20 rastesh që nga java 32, në Grosseto-Prugna (Corse-du-Sud, n=14, rritje prej një rasti), Salon-de-Provence, Grans dhe Lambesc (Bouches-du-Rhône, n=13, pa rritje), Castries (Hérault, n=12, rritje prej një rasti), Poulx dhe Caveirac (Gard, n=11, rritje prej tetë rastesh). Këtë javë, Italia raportoi pesë raste të reja në tre grumbuj të rinj, tre raste në Modena dhe dy raste në provincën e Veronës. Të pesë grumbujt e identifikuar në Itali janë aktualisht aktivë.

Survejanca sezonale e dengues – 2025

Që nga fillimi i vitit 2025 dhe që nga 13 gushti 2025, tre vende në Evropë kanë raportuar raste të dengues: Franca (11), Italia (katër) dhe Portugalia (dy).

Këtë javë, Franca raportoi një rast të ri të dengues të fituar në nivel lokal në një grumbull të identifikuar rishtazi brenda departamentit Lot, duke shënuar rastin e parë të transmetimit lokal në këtë zonë. Aktualisht janë raportuar gjashtë grumbullime në Francë, nga të cilat vetëm njëri është i mbyllur - i vendosur në Aubagne, departamenti Bouches-du-Rhône. Përveç kësaj, Italia raportoi një rast të ri këtë javë në një grumbull të ri në provincën e Vicenzës, duke e çuar totalin në dy grumbullime aktive në vend. Portugalia nuk raportoi raste të reja këtë javë. Dy rastet e raportuara në janar në Madeira, një rajon më i largët i Portugalisë, ndoshta u transmetuan në vitin 2024.

Ky raport mbulon BE/EEA kontinentale, si dhe rajonet më të largëta të Portugalisë dhe Spanjës.

Survejanca sezonale e etheve hemorragjike Krime-Kongo – 2025

Që nga fillimi i vitit 2025 dhe që nga 13 gushti 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të etheve hemorragjike Krime-Kongo (CCHF): Spanja (tre) dhe Greqia (dy). Këtë javë, nuk janë raportuar raste të reja të CCHF në ECDC.

Rastet në Greqi që ndodhën në rajonin e Thesalisë janë të papritura, pasi ky rajon dhe rajonet fqinje nuk kanë raportuar më parë raste të CCHF ose qarkullim të virusit CCHF në kafshë. Rasti primar ka të ngjarë të jetë infektuar nëpërmjet një pickimi rriqre, ndërsa rasti sekondar ishte tek një profesionist i kujdesit shëndetësor i cili ofroi kujdes për rastin primar.

Këto janë rastet e para në vend që nga viti 2008 kur i vetmi rast i fituar në nivel lokal deri më sot u gjet në rajonin e Trakisë (në kufi me Bullgarinë). Rastet në Spanjë nuk janë të papritura, pasi virusi CCHF dihet se qarkullon midis kafshëve në provincën e Salamancës, rajonin e Castile dhe León dhe provincën e Toledos, rajonin e Castilla-La Mancha dhe rastet e CCHF tek njerëzit janë raportuar më parë në të dyja zonat.

Vlerësimi i ECDC:

Nga viti 2016 deri në vitin 2024, në Spanjë janë raportuar gjithsej 16 raste autoktone të CCHF, me datat e fillimit të sëmundjes midis prillit dhe gushtit. Provinca e Salamancës është një vatër e nxehtë për CCHF, me 50% të rasteve që janë të ekspozuara ndaj rriqrave. Dy raste janë zbuluar më parë në të njëjtin lokalitet si rasti aktual. Në këtë zonë, prania e *Hyalomma marginatum*, vektori kryesor i kësaj sëmundjeje, është e njohur mirë, dhe studimet e kryera në kafshë të egra dhe shtëpiake kanë treguar seroprevalencë më të lartë se 70% për virusin CCHF. Një rast i CCHF në provincën e Toledos u raportua në vitin 2024. Prandaj, ngjarjet aktuale nuk janë të papritura. Edhe pse rreziku i infektimit me CCHF për popullatën e përgjithshme në zonat ku dihet se virusi është i pranishëm në Spanjë është i ulët, ky rrezik rritet në mënyrë drastike për njerëzit që kryejnë aktivitete që i ekspozojnë ata ndaj pickimeve të rriqnave (p.sh. gjuetia, puna në pylltari, ecja në natyrë, mbikëqyrja e kafshëve). Si një masë paraprake e përgjithshme kundër CCHF, por edhe kundër sëmundjeve të tjera të transmetuara nga rriqnat, njerëzit që mund të jenë të ekspozuar ndaj rriqrave duhet të zbatojnë masa mbrojtëse personale kundër pickimeve të rriqnave (Masat Mbrojtëse të ECDC kundër rriqrave). Rriqnat nga *Hyalomma* spp. konsiderohen si vektorët kryesorë të virusit CCHF. *Hyalomma marginatum* është gjerësisht i pranishëm në Evropën Jugore dhe Lindore. Një vektor tjetër është *Hyalomma lusitanicum*, i cili është i pranishëm në pjesë të Evropës Jugore.

Transmetimi i lidhur me kujdesin shëndetësor jo i ndërmjetësuar nga rriqnat është gjithashtu i dokumentuar dhe më shpesh vjen pas kontaktit perkutan ose kontaktit tjetër të lëkurës me gjakun ose lëngjet trupore të pacientit, por mund të ndodhë edhe pas afërsisë së ngushtë dhe të pambrojtur ose

kontaktit me sipërfaqe të kontaminuara. Në vitin 2024, OBSH publikoi udhëzime operative mbi parandalimin dhe kontrollin e infeksionit CCHF në mjediset e kujdesit shëndetësor.

Survejanca javore sezonale e infeksionit të virusit të Nilit Perëndimor – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 13 gushti 2025, tetë vende në Evropë kanë raportuar raste njerëzore të infeksionit të virusit të Nilit Perëndimor: Bullgaria, Franca, Greqia, Hungaria, Italia, Rumania, Serbia dhe Spanja.

Numri i rasteve të raportuara deri më tani këtë vit është pak mbi mesataren e dekadës së kaluar në të njëjtën periudhë (163). Megjithatë, këto shifra mbeten më të ulëta se ato të vërejtura në vitet 2024 dhe 2018 - vite kur qarkullimi i virusit ishte veçanërisht intensiv, me përkatësisht 382 dhe 385 raste të raportuara deri në këtë pikë të vitit.

Që nga 6 gushti, rastet e infeksionit të virusit të Nilit Perëndimor (WNV) tek njerëzit e fituara në nivel lokal janë raportuar në 40 rajone në gjashtë vende. Kjo krahasohet me 108 rajone (11 vende) gjatë së njëjtës periudhë në vitin 2024 dhe 68 rajone në vitin 2018 (shtatë vende). Të gjashtë vendet kanë raportuar më parë raste të WNV tek njerëzit. Italia aktualisht po përjeton një shpërthim të konsiderueshëm, me 168 infeksione të konfirmuara tek njerëzit, përfshirë 10 vdekje. Për herë të parë në Itali, provincat e Latinës (ITI44) dhe Frosinone (ITI45) kanë raportuar raste tek njerëzit. Në mënyrë të ngjashme, Rumania ka raportuar rastet e saj të para në Qarkun e Sălaj (RO116). Siç është vërejtur në vitet e kaluara, shumica e rasteve ishin midis meshkujve të moshës 65 vjeç e lart. Shkalla e shtrimit në spital ishte e lartë krahasuar me vitet e kaluara, me 100% të rasteve të shtruar në spital këtë vit krahasuar me 93% në dekadën e kaluar. Që shumica e rasteve janë shtruar në spital ka shumë të ngjarë të jetë për shkak të natyrës së mbikëqyrjes së VNP-së, e cila tenton të kapë kryesisht rastet më të rënda. Shkalla e vdekshmërisë deri më tani këtë vit është 7%, e cila është e krahasueshme me 11% të vëzhguar në dekadën e kaluar. Manifestimet neurologjike u raportuan në 56% të rasteve këtë vit krahasuar me 66% në dekadën e kaluar. Në përgjithësi, pritet një dominim i rasteve neurologjike, pasi rastet me simptoma më të rënda kanë më shumë gjasa të diagnostikohen.

Rastet e malaries të fituara në nivel lokal në Mayotte, Francë - 2025

- Në vitin 2025, dhe deri më 31 korrik, 12 raste të malaries të fituara në nivel lokal janë raportuar në Mayotte, Francë.
- Midis këtyre rasteve, dhjetë u raportuan gjatë gjysmës së dytë të korrikut 2025.
- Këto raste përbëjnë rastet e para të raportuara të fituara në nivel lokal që nga korriku 2020 në Mayotte.

- Probabiliteti i infeksionit në Mayotte mbetet shumë i ulët dhe nuk përbën rrezik shtesë për Evropën kontinentale.

Listerioza - Shumëvendëshe (BE/EEA) - 2024-2025

- Një grup prej 21 rastesh të *Listeria monocytogenes* me dy vdekje janë identifikuar në Francë.
- Shumica e rasteve kanë ndodhur midis fillimit të qershorit dhe mesit të korrikut 2025.
- Katër vende të tjera raportojnë nga një rast listerioze gjenetikisht identik secila (Belgjika, Danimarka, Holanda dhe Norvegjia).
- Produktet ushqimore të dyshuara janë djathë i pasterizuar me qumësht lope dhe dhie nga Franca, i disponueshëm në tregjet kombëtare dhe evropiane, si dhe për eksport ndërkombëtar.
- Produktet janë tërhequr nga tregu, por për shkak të periudhës së gjatë të inkubacionit të listeriozës, mund të ndodhin më shumë raste.