



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 34
18 Gusht – 24 Gusht 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	9 / 10	90%
	Durrës	Durrës	19 / 20	95%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	10 / 11	91%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	10 / 11	91%
	Kukës	Kukës	13 / 14	93%

		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	5 / 9	56%
	Lezhë	Lezhë	11 / 11	100%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	4 / 6	67%
VLOREË	Vlorë	Vlorë	21 / 21	100%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	417 / 429	97%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 34

	JAVA 34
Diarre pa gjak	5576
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	6703
Inf. Resp. te poshtëme	2389
Rash me temperaturë	13
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	417
% e Njësive Raportuese	97% (417/429)


Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:


Tiranë – 12 raste

Fier – 1 rast

Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën 34 krahasuar me javën paraardhëse, java 33

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 34 krahasuar me javën paraardhëse, java 33.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 34 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 34 të vitit 2025 vërehet një rritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 33 dhe 34/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 34 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 34 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër me i larte i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 33 dhe 34/ 2025. Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje kombëtare***Situata epidemiologjike e infeksioneve respiratore Grip, Covid-19 dhe RSV***

Gjatë javës së tridhjetë e kater (18-24 gusht 2025) numri i rasteve të konfirmuara është 98 raste dhe numri i vdekjeve është 0.

Numri i rasteve të konfirmuara gjatë 232 javëve të epidemisë është 322717.

Tabela 3 . Rastet javore me COVID - 19

	Java 34		Java 33
Raste të reja të konfirmuara	98	↗	32
Incidenca (Nr. rastesh/100000 banorë)	3.42	↗	1.33

13(13.2%) nga 98 raste rastet janë konfirmuar me PCR dhe 85 (86.8%) janë konfirmuar me test të shpejte. Nga rastet e konfirmuara 17 (17.3%) janë të hospitalizuar , 8 prej tyre janë raportuar si raste SARI. Rastet e shtruar i përkasin grupmoshës pediatrike 9 (52%) dhe 8 raste (48%) moshës adulte.


Tabela 4. Shperndarja e rasteve të konfirmuara sipas bashkive

	Raste	Perqindje
Belsh	2	2%
Berat	1	1%
Divjake	1	1%
Durres	8	8%
Fier	11	11%
Gjirokaster	1	1%
Himare	6	6%
Kamez	7	7%
Kolonje	2	2%
Kurbin	1	1%
Lezhe	2	2%
Lushnje	1	1%
Maliq	3	3%
Mat	1	1%
Memaliaj	1	1%
Patos	3	3%
Pogradec	2	2%
Prrenjas	1	1%

Rrogozhine	5	5%
Shkoder	2	2%
Tepelene	1	1%
Tirane	30	31%
Vlore	4	4%
Vore	2	2%

Në javën 34 në muajin Gusht , nga survejanca sentinel janë testuar në total 43 mostra nga të cilat te gjitha (100%) janë SARI. Asnjë nga mostrat nuk u konfirmuan per Grip dhe RSV ndërsa 8 (18.1%) jane konfirmuar me Covid-19.

Grafiku 10. Rezultati i testimit për Covid-19 i mostrave ILI dhe SARI sipas Qendrave Sentinel



Nga 8 rastet e konfirmuara me COVID-19 , 3 (37%) i përkasin grupmoshës pediatrike.

Ngjarje ndërkombëtare

Përmbledhje e epidemiologjisë së viruseve respiratorë në BE/EEA

- Shkalla e konsultimeve të kujdesit parësor dhe dytësor për sëmundjet respiratore është në nivele bazë ose të ulëta për periudhën e verës. Në përgjithësi, qarkullimi i gripit dhe RSV ka mbetur i ulët pas epidemive të dimrit.
- Pas një periudhe dimërore me qarkullim të kufizuar të SARS-CoV-2, është vërejtur një rritje e vazhdueshme e treguesve të qarkullimit të SARS-CoV-2 në disa vende. Megjithatë, pranimet në spital të SARS-CoV-2, pranimet në kujdes intensiv dhe vdekjet mbeten më të ulëta se gjatë së njëjtës periudhë në vitin 2024.

- Gjatë javës së 33-të, pati një rritje të pozitivitetit të përgjithshëm të gripit në mostrat e kujdesit parësor (8.2%), kryesisht të nxitura nga një vend (Danimarka).

Survejanca sezonale e etheve hemorragjike Krime-Kongo – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe që nga 20 gushti 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të etheve hemorragjike Krime-Kongo (CCHF): Spanja (tre) dhe Greqia (dy).
- Këtë javë, nuk janë raportuar raste të reja të CCHF në ECD

Survejanca sezonale e etheve Dengue– 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe deri më 20 gusht 2025, tre vende në Evropë kanë raportuar raste të etheve Dengue: Franca (11), Italia (katër) dhe Portugalia (dy).
- Këtë javë, nuk janë raportuar raste të reja të etheve të dengut në ECDC.

Survejanca sezonale javore e infeksionit me virusin e Nilit Perëndimor – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe deri më 20 gusht 2025, nëntë vende në Evropë raportuan raste njerëzore të infeksionit me virusin e Nilit Perëndimor: Shqipëria, Bullgaria, Franca, Greqia, Hungaria, Italia, Rumania, Serbia dhe Spanja.

Survejanca sezonale e sëmundjes së virusit chikungunya – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe deri më 20 gusht 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të sëmundjes së virusit chikungunya: Franca (156) dhe Italia (29).
- Këtë javë, Franca raportoi 45 raste të reja të fituara në vend të sëmundjes së virusit chikungunya, ndërsa Italia raportoi 22 raste të reja të fituara në vend.

Sëmundja e shkaktuar nga virusi Chikungunya – Monitorimi i shpërthimeve globale – Përditësim mujor

- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe deri në gusht, janë raportuar afërsisht 317 000 raste të CHIKVD dhe 135 vdekje të lidhura me CHIKVD në 16 vende/territore. Rastet janë raportuar në Amerikë, Afrikë, Azi dhe Evropë (Francë - rajone kontinentale dhe më të largëta, dmth. Réunion dhe Mayotte - dhe Itali).

Shpërthimi i Chikungunya në Kinë

- Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) e Provincës Guangdong ka raportuar 830 raste të reja të sëmundjes së virusit chikungunya (CHIKV) në provincën Guangdong, Kinë për periudhën 10-16 gusht.
- Që nga fillimi i shpërthimit në korrik 2025, dhe deri më 16 gusht 2025, janë raportuar 9 933 raste të sëmundjes CHIKV në provincën Guangdong.
- ECDC u kërkon vendeve të raportojnë rastet e importuara të chikungunya-s përmes EpiPulse Events.

Dengue –Monitorimi i shpërthimeve globale – Përditësim mujor

- Që nga fillimi i vitit 2025, mbi katër milionë raste të dengut dhe mbi 2 500 vdekje të lidhura me dengun janë raportuar nga 101 vende/territore, në nivel global.

Në Evropën kontinentale, një rast autokton është raportuar në Francë dhe Itali në vitin 2025. Raste janë raportuar edhe nga rajonet më të largëta të BE-së.

Rastet e importuara të sëmundjes së virusit Oropouche - BE/EEA dhe Mbretëria e Bashkuar - 2024/2025

- Në vitin 2025, gjashtë raste të importuara të sëmundjes së virusit Oropouche u raportuan në vendet e BE-së: Francë (4), Austri (1) dhe Gjermani (1). Përveç kësaj, Mbretëria e Bashkuar raportoi tre raste të importuara. Të gjitha rastet e raportuara kishin një histori të dokumentuar të udhëtimeve të fundit ndërkombëtare. Nga këto nëntë raste të importuara, gjashtë raste kishin një histori udhëtimi në Brazil, një në Kolumbi, një në Dominikë dhe një rast në Amerikën e Jugut (Kolumbi, Brazil, Porto Riko).
- Në vitin 2024, 44 raste të importuara të sëmundjes së virusit Oropouche u raportuan në vendet e BE-së: Spanjë (23), Itali (8), Francë (7), Gjermani (3), Austri (1), Suedi (1) dhe Holandë (1). Dyzet e tre raste kishin një histori udhëtimi në Kubë dhe një në Brazil.
- Rreziku i infeksionit për qytetarët e BE/EEA-së që udhëtojnë në vendet e epidemisë së virusit Oropouche (OROV) në Amerikë vlerësohet si i moderuar.
- Rreziku i sëmundjes OROV të fituar në nivel lokal në BE/EEA është i ulët.

Poliovirusi i tipit 1 i derivuar nga vaksina në qarkullim (cVDPV1) - Izrael - 2025

- Më 4 gusht 2025, Izraeli njoftoi OBSH-në për një shpërthim të poliovirusit të tipit 1 të derivuar nga vaksina në qarkullim (cVDPV1).

- cVDPV1 është zbuluar në nëntë mostra mjedisore të mbledhura midis shkurtit dhe korrikut 2025 nga shtatë vende.
- Të gjitha izolatet janë të lidhura gjenetikisht dhe zbulimet e vazhdueshme tregojnë transmetim të qëndrueshëm në komunitet.
- Nuk janë raportuar raste të poliomielitit.