



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

**BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 36**

1 – 7 Shtator 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Perqindja e plotesueshmerise				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	10 / 10	100%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	10 / 11	94%
	Kukës	Kukës	14 / 14	100%

		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	6 / 9	67%
	Lezhë	Lezhë	11 / 11	100%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	4 / 6	67%
VLORE	Vlorë	Vlorë	21 / 21	100%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	422 / 429	98%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 36

	JAVA 36
Diarre pa gjak	4463
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	6545
Inf. Resp. te poshtëme	2345
Rash me temperaturë	6
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	422
% e Njësive Raportuese	98% (422/429)


Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:


Tiranë –5 raste

Fier – 1 rast

Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 36 krahasuar me javën paraardhëse, java 35

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave



Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ulje në javën 36 krahasuar me javën paraardhëse, java 35


.

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 36 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 36 vërehet prirje në ulje e numrit të rasteve “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” por ky numër është më i lartë krahasuar me një vit më parë.


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 35 dhe 36/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10 – 36 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 36 vërehet prirje në ulje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak” por ky numër është më i lartë krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 35 dhe 36/ 2025.
Incidenca (raste/10.000)



❖ Ngjarje ndërkombëtare

Shpërthim shumëvendësh i Salmonella Strathcona

- Midis 1 janarit 2023 dhe 30 gushtit 2025, 289 raste të konfirmuara të Salmonella Strathcona ST2559 janë raportuar në 19 vende të BE/EEA-së dhe tre vende jashtë BE/EEA-së (Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara dhe Kanada).
- Izolate të lidhura gjenetikisht ngushtë me llojin e shpërthimit janë zbuluar që nga viti 2011, duke treguar një shqetësim të përsëritur për shëndetin publik.
- Hetimet epidemiologjike, mikrobiologjike dhe të gjurmueshmërisë në 2023 dhe 2024 identifikuan domate të vogla nga rajoni i Sicilisë në Itali si mjetin e infeksionit.
- Rreziku për infeksione të reja mbetet nëse vazhdojnë dërgesat sezonale të produkteve të kontaminuara. Në 2025, disa vende kanë raportuar më shumë se 30 raste të tjera, kryesisht midis qershorit dhe gushtit, me Italinë që raporton numrin më të lartë. ECDC po bashkëpunon me FWD-Net dhe EFSA për të monitoruar dhe koordinuar përpjekjet e reagimit.

Survejanca sezonale javore e infeksionit nga virusi i Nilit Perëndimor – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe deri më 3 shtator 2025, nëntë vende në Evropë kanë raportuar raste njerëzore të infeksionit nga virusi i Nilit Perëndimor: Shqipëria, Bullgaria, Franca, Greqia, Hungaria, Italia, Rumania, Serbia dhe Spanja.

Survejanca sezonale e Dengues – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe deri më 3 shtator 2025, tre vende në Evropë kanë raportuar raste të dengues: Franca (19), Italia (katër) dhe Portugalia (dy).
- Këtë javë, Franca raportoi raste të reja.

Survejanca sezonale e sëmundjes së virusit chikungunya – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025 dhe deri më 3 shtator 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të sëmundjes së virusit chikungunya: Franca (301) dhe Italia (107).
- Këtë javë, Franca raportoi 74 raste të reja të fituara në vend të sëmundjes së virusit chikungunya, ndërsa Italia raportoi 44 raste të reja të fituara në vend.

Survejanca sezonale e etheve hemorragjike Krime-Kongo – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 3 shtatori 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të etheve hemorragjike Krime-Kongo (CCHF): Spanja (tre) dhe Greqia (dy).
- Këtë javë, nuk janë raportuar raste të reja të CCHF në ECDC.

Sëmundja e virusit Ebola - Republika Demokratike e Kongos - 2025

- Më 4 shtator 2025, autoritetet shëndetësore në Republikën Demokratike të Kongos (RDK) deklaruan një shpërthim të sëmundjes së virusit Ebola në Provincën Kasai.
- Që nga 4 shtatori 2025, ka 28 raste të dyshuara dhe 16 vdekje (CFR-57%), përfshirë katër punonjës të kujdesit shëndetësor.
- Zonat shëndetësore Bulape dhe Mweka në Provincën Kasai janë raportuar si të prekura.
- Rastet dhe vdekjet e raportuara paraqitën simptoma duke përfshirë ethe, të vjella, diarre dhe hemorragji.
- Më 3 shtator, rezultatet laboratorike konfirmuan shkakun e shpërthimit si Ebola Zaire e shkaktuar nga sëmundja e virusit Ebola.
- Rreziku aktual për qytetarët e BE/EEA-së që jetojnë ose udhëtojnë për në provincën Kasai në RDK vlerësohet të jetë i ulët, për shkak të probabilitetit të ulët aktual të ekspozimit. Për qytetarët në BE/EEA rreziku është shumë i ulët, pasi probabiliteti i futjes dhe transmetimit sekondar brenda BE/EEA-së është shumë i ulët.

Koronavirusi i sindromës respiratore të Lindjes së Mesme (MERS-CoV) – Shumëvendësh – Përditësim mujor

- Që nga përditësimi i mëparshëm më 5 gusht 2025, dhe që nga 1 shtatori 2025, nuk janë raportuar raste të reja të MERS nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ose autoritetet kombëtare shëndetësore.
- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 1 shtatori 2025, janë raportuar 11 raste të MERS në Arabinë Saudite me datë fillimi në vitin 2025, duke përfshirë dy vdekje.
- Probabiliteti i transmetimit të qëndrueshëm nga njeriu te njeriu midis popullatës së përgjithshme në Evropë mbetet shumë i ulët, dhe ndikimi i sëmundjes në popullatën e përgjithshme konsiderohet të jetë i ulët. Situata aktuale e MERS-CoV paraqet një rrezik të ulët për BE/EEA-në.