



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 41
06 Tetor – 12 Tetor 2025

Për këtë javë, kanë raportuar 36 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%
		Kavajë	8 / 10	80%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	10 / 11	91%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	14 / 15	93%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 6	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%
		Pukë	11 / 11	100%
	Kukës	Kukës	12 / 14	86%

		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	8 / 9	89%
	Lezhë	Lezhë	11 / 11	100%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	4 / 6	67%
VLOREË	Vlorë	Vlorë	20 / 21	95%
		Sarandë	9 / 9	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastër	Gjirokastër	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	418 / 429	97%

- *Kavaja dhe Mirdita , kane perqindje te ulet raportimi per shkak te mos raportimit ne kohe pasi referojne vonesa ne rregjistrim per shkak te internetit.*



Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 41

	JAVA 41
Diarre pa gjak	1969
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	8646
Inf. Resp. te poshtëme	3136
Rash me temperaturë	14
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	418
% e Njësive Raportuese	97% (418/429)

Rash me temperaturë


Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë:

Tiranë – 14 raste


Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën 41 krahasuar me javën paraardhëse, java 40.

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ulje në javën 41 krahasuar me javën paraardhëse, java 40

Grafiku 5. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 41 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 41 të vitit 2025 vërehet një rritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sidomos në moshën feminare deri në 5 vjeç por edhe në ato mbi 60 vjeç


Grafiku 6. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 7. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 40 dhe 41/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Prirja e “Diarre pa Gjak” në javët 10 – 41 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 41 vërehet prirje në ulje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak” ,këtë vit vërehet një numër me i larte i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 9. Frekuenca e hasjes së “Diarre pa gjak” sipas NJVKSH në javën 40 dhe 41/ 2025. Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje ndërkombëtare

Survejanca sezonale e infeksioneve të virusit të Nilit Perëndimor – 2025

- Në vitin 2025, dhe që nga 3 tetori 2025, 13 vende në Evropë raportuan 989 raste të infeksionit nga WNV tek njerëzit e fituara në nivel lokal.
- Nga perspektiva veterinare, 127 shpërthime të WNV tek kuaj dhe 217 shpërthime tek zogjtë janë raportuar në Evropë në vitin 2025.
- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 8 tetori 2025, 13 vende në Evropë raportuan raste njerëzore të infeksionit me virusin e Nilit Perëndimor: Shqipëria, Bullgaria, Kroacia, Franca, Greqia, Hungaria, Italia, Kosova*, Maqedonia e Veriut, Rumania, Serbia, Spanja dhe Turqia.

Survejanca sezonale e etheve hemorragjike Krime-Kongo – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 8 tetori 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të ethes hemorragjike Krime-Kongo (CCHF): Spanja (3) dhe Greqia (2).
- Rasti më i fundit i raportuar në ECDC ishte në javën e 32-të.

Survejanca sezonale e sëmundjes së virusit chikungunya – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 8 tetori 2025, dy vende në Evropë kanë raportuar raste të sëmundjes së virusit chikungunya: Franca (700) dhe Italia (353).
- Javën e kaluar, Franca ka raportuar 63 raste të reja të fituara në vend të sëmundjes së virusit chikungunya dhe Italia ka raportuar 30.
- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga shtatori, afërsisht 339 822 raste të sëmundjes së virusit chikungunya (CHIKVD) dhe 145 vdekje të lidhura me CHIKVD janë raportuar në 24 vende/territore. Raste janë raportuar në Amerikë, Afrikë, Azi dhe Evropë (Francë - rajonet kontinentale dhe më të largëta, d.m.th. Reunion dhe Majotte - dhe Itali).

Survejanca sezonale e Dengues – 2025

- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 8 tetori 2025, tre vende në Evropë kanë raportuar raste të dengues: Franca (28), Italia (4) dhe Portugalia (2).
- Javën e kaluar, Franca ka raportuar dy raste të reja të dengues të fituara në vend, një në një grumbull në Aubagne dhe një në një grumbull të ri në Roques. Tre grupe në Francë janë aktualisht aktive.
- Asnjë vend tjetër nuk ka raportuar raste të dengues gjatë javës së kaluar.
- Që nga fillimi i vitit 2025, mbi katër milionë raste të Dengues dhe mbi 2 800 vdekje të lidhura me dengues janë raportuar nga 101 vende/territore, në nivel global. Në Evropën kontinentale, 30 raste autoktone janë raportuar në Francë dhe Itali në vitin 2025. Raste janë raportuar edhe nga rajonet më të largëta të BE-së.

Sëmundja e virusit Chikungunya – Shumë vende (Botë) – Monitorimi i shpërthimeve globale –

Fruthi –Monitorimi i shpërthimeve evropiane – monitorim mujor

- Në gusht 2025, 96 raste të fruthit u raportuan nga nëntë vende në BE/EEA. Tetëmbëdhjetë vende raportuan zero raste.
- Gjatë periudhës 12-mujore, tetë vdekje që i atribuohen fruthit u raportuan në ECDC nga Rumania (pesë), Franca (dy) dhe Holanda (një).
- Në përgjithësi, numri i rasteve u ul krahasuar me muajin e kaluar; kjo është në përputhje me sezonalitetin e fruthit.

- Shpërthimet janë zbuluar përmes aktiviteteve plotësuese të inteligjencës epidemike në BE/EEA (Spanja, Franca) dhe vende të tjera.

Koronavirusi i sindromës respiratore të Lindjes së Mesme (MERS-CoV) –Përditësim mujor

- Që nga përditësimi i mëparshëm më 1 shtator 2025, dhe që nga 6 tetori 2025, një fatalitet i ri nga MERS në Arabinë Saudite me datë fillimi në korrik 2025 është raportuar nga Rajoni Mesdhetar Lindor i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH EMRO).
- Që nga fillimi i vitit 2025, dhe që nga 6 tetori 2025, 12 raste të MERS janë raportuar në Arabinë Saudite me datë fillimi në vitin 2025, duke përfshirë tre vdekje.
- Probabiliteti i transmetimit të qëndrueshëm nga njeriu te njeriu midis popullatës së përgjithshme në Evropë mbetet shumë i ulët, dhe ndikimi i sëmundjes në popullatën e përgjithshme konsiderohet gjithashtu i ulët. Situata aktuale e MERS-CoV paraqet një rrezik të ulët për BE/EEA-në.

Sëmundja e virusit Ebola – Republika Demokratike e Kongos – 2025

- Që nga 5 tetori 2025, 64 raste (53 të konfirmuara dhe 11 të mundshme) të sëmundjes së virusit Ebola (EVD) janë raportuar në Provincën Kasai, Republika Demokratike e Kongos (RDK), duke përfshirë 43 vdekje (32 të konfirmuara dhe 11 të mundshme; shkalla e vdekshmërisë së rasteve (CFR) midis të gjitha rasteve: 67.2%).
- Të gjitha rastet e konfirmuara janë raportuar nga zona shëndetësore Bulape.
- Janë identifikuar gjithsej 1 985 kontakte dhe janë vaksinuar 20 190 individë.
- Rreziku aktual për njerëzit nga BE/EEA që jetojnë ose udhëtojnë në provincën Kasai në RDK vlerësohet të jetë i ulët, për shkak të gjasave të ulëta aktuale të ekspozimit. Për njerëzit që jetojnë në BE/EEA, rreziku është shumë i ulët, pasi gjasat e hyrjes dhe transmetimit sekondar brenda BE/EEA-së janë shumë të ulëta.