



INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

Buletini Epidemiologjik Javor
COVID, GRIP, ILLI/SARI
Java 46, Viti 2025

Tiranë,
18 Nëntor 2025

PËRMBATJA


PËRMBATJA.....	2
MBI GRIPIN DHE RASTET ME SËMUNDJE TË RËNDË RESPIRATORE AKUTE SARI (SRRA) DHE ILI PER GRIP, COVID-19 DHE RSV. SEZONI 2025-2026	3
Përmbledhje e Rajonit Evropian të OBSH-së, Java 46/2025	13
Përmbledhje e përgjithshme	13
Përbërja e viruseve të karakterizuara.....	13
Aktiviteti i viruseve respiratore	13
Ashpërsia e infeksioneve	14
Vdekshmëria.....	15
COVID-19 SITUATA NË JAVA 46, VITI 2025 NË VENDIN TONË	17

MBI GRIPIN DHE RASTET ME SËMUNDJE TË RËNDË RESPIRATORE AKUTE SARI (SRRA) DHE ILI PER GRIP, COVID-19 DHE RSV. SEZONI 2025-2026

Përmbledhje e Sezonit 2025 – 2026

Në periudhën 1 Tetor deri në 16 Nëntor 2025 në Survejancën e Integruar ILI/SRRA janë raportuar 507 raste nga të cilat 168 (33.1%) janë raste ILI ndërsa 339 (66.9%) raste SRRA. Mostrat janë testuar për SARS CoV-2, viruset e Gripit dhe virusin respirator sincial (RSV).

Në total për sezonin në javën 46 muaji Nëntor 8 (1.6%) e mostrave janë konfirmuar me me Grip tip A dhe 20 (3.9%) janë konfirmuar me SARS CoV-2.




Grafiku 1. Shpërndarja e rasteve ILI dhe SARI sipas javëve dhe muajve

Në muajin Tetor është evidentuar qarkullimi i Gripit të tipit A dhe vërehet një prirje graduale në ritje e rasteve ILI dhe SARI me luhajtje të lehta javore.



Tabela 1 Konfirmimi laboratorik për totalin e mostrave te sezonit 2025-2026

Lloji i mostrave	SARS CoV-2	Grip (Tip A)	Grip (Tip B)	RSV
ILI	7 (4.02)	3 (1.8)		
SARI	13 (3.8)	5 (1.5)		
Total	20 (3.9)	8 (1.6)		




Grafiku 3. Konfirmimi laboratorik për totalin e mostrave të sezonit 2024-2025

Në total 8 (1.6%) mostra janë konfirmuar me Grip tip A dhe 20 (3.9%) mostra janë konfirmuar me SARS-CoV-2.





Grafiku 4. Konfirmimi laboratorik i mostrave ILI dhe SRRA

- Nga mostrat ILI 3 (1.8%) e tyre janë konfirmuar Grip tip A ndërsa 7 (4.2%) e tyre janë konfirmuar me SARS-CoV-2
- Nga mostrat SARI 5 (1.5%) e tyre janë konfirmuar me Grip tip A ndërsa 13 (3.8%) e tyre janë konfirmuar me SARS-CoV-2.



Grafiku 5. Numri i rasteve ILI-SARI të konfirmuara me grip sipas javëve

Qarkullimi i Gripit në vend ka filluar më herët krahasuar me sezonin e kaluar 2024-2025



Grafiku 6. Pozitiviteti i mostrave ILI dhe SARI për SARS CoV-2 dhe Grip sipas javëve


Në muajin Tetor 2025 vërehet fillimi i sezonit respirator, me një rritje graduale të rasteve ILI dhe SARI dhe pozitivitetet të moderuar për SARS-CoV-2, por aktiviteti i Gripit paraqet **fillim të hershëm sezonal** dhe pritet të **intensifikohet në javët pasuese**, duke ndjekur rritjen e numrit të rasteve respiratore ILI dhe SARI.

Përmbledhje e Javës 46 /2025 (10 – 16 Nëntor 2025)

Në javën 46 në muajin Nëntor, nga survejanca sentinel janë testuar në total 61 mostra nga të cilat 18 (29.5%) janë ILI dhe 43 (70.5%) janë SARI.

Në total, 2 (3.3%) mostra u konfirmua për Grip ndërsa 4 (6.6%) mostra u konfirmuan për Covid-19.


-Nga survejanca jo-sentinel janë testuar 17 mostra nga të cilat rezultuan negative për Grip.




Grafiku 7. Rezultati i testimit për Covid i mostrave ILI dhe SARI

Nga rastet ILI për Grip u konfirmua 1 (5.6%) e mostrave ndërsa për Covid-19 u konfirmua 1 (5.6%) e mostrave.


Nga rastet SARI për Grip u konfirmuan 1 (3.9%) e mostrave ndërsa për Covid-19 nuk u konfirmua asnjë mostër.



Grafiku 8. Shpërndarja e rasteve SARI dhe konfirmimi laboratorik sipas qendrave sentinel




Grafiku 9. Shpërndarja e rasteve SARI dhe konfirmimi laboratorik sipas qendrave sentinel



Grafiku 10. Shpërndarja e rasteve ILI dhe konfirmimi laboratorik sipas grupmoshës

Pozitiviteti për grupmoshën 25-34 vjeç është (50%).



Grafiku 11. Shpërndarja e rasteve SARI dhe konfirmimi laboratorik sipas grupmoshës

Pozitiviteti më i lartë është për grupmoshën 75+ vjeç (28.6%) ndjekur nga 0-4 vjeç (16.7%).

PËRMBLEDHJA E RAJONIT EUROPIAN TË OBSH, JAVA 45/2025 (3–9 NËNTOR 2025)

(<https://erviss.org/>)

PËRMBLEDHJE

Tre vende ose zona të Rajonit European të OBSH që raportojnë të dhëna, raportuan norma të sëmundjes së ngjashme me gripin (ILI) dhe/ose infeksioneve akute respiratore (ARI) të ngritura mbi nivelet bazale në javën 45/2025.

Java 45 ishte java e parë e sezonit 2025/26 në të cilën përqindja e kombinuar e pozitivitetit të gripit në kujdesin parësor për rajonin ishte mbi 10%. Megjithatë, vetëm 3 vende ose zona raportuan intensitet mesatar të gripit. Detektimet e gripit dhe pozitiviteti nga testimet spitalore janë gjithashtu rritur, në të cilat një përqindje më e lartë janë të moshës 65 vjeç ose më shumë. Shumica e detektimeve të gripit janë të tipit A (H3).

Treguesit rajonalë të aktivitetit të SARS-CoV-2 vazhdojnë të bien, por mbeten të ngritur në disa vende dhe zona.

Identifikimet e RSV dhe pozitiviteti mbeten në nivele të ulëta në nivel rajonal, megjithëse shtrimet spitalore dhe në ICU janë në rritje.

AKTIVITETI I VIRUSEVE RESPIRATORE

Nivelet e sëmundjes së ngjashme me gripin janë të ngritura mbi nivelin bazë në 1 vend (Kazakistan) dhe normat e infeksioneve akute respiratore janë të ngritura në 2 vende (Shqipëri dhe Spanjë).

Në të gjithë Rajonin, përqindja e mostrave nga pacientët që paraqiten në pikat sentinel ILI dhe ARI që kanë rezultuar pozitive për:

Gripi u rrit mbi pragun epidemik 10% në 11% krahasuar me 9% në javën e mëparshme. Pozitiviteti median për 24 vende dhe zona ishte 4% (varia: 0%–37%) dhe 7 vende dhe zona raportuan të paktën 10%: Irlanda, Portugalia, Sllovenia, Spanja, Zvicra, Mbretëria e Bashkuar (Irlanda Veriore) dhe Mbretëria e Bashkuar (Skocia).

SARS-CoV-2 mbeti në 7% krahasuar me javën e mëparshme. Pozitiviteti median për 24 vende dhe zona ishte 4% (varia: 0%–50%).

RSV mbeti në 1% krahasuar me javën e mëparshme. Pozitiviteti median për 23 vende dhe zona ishte 0% (varia: 0%–5%).

Identifikimet e virusit të gripit me tip të njohur të raportuara nga kujdesi parësor sentinel për javën e kaluar (n=317) ishin të gjitha viruset të tipit A (100%) dhe, ndër viruset A të nën-tipizuara (n=198), kishte një përzierje të A(H3) (74%) dhe A(H1)pdm09 (26%).

Nga 36 vende dhe zona që raportuan intensitetin e gripit: tre raportuan intensitet mesatar ose më të lartë (Bullgaria, Gjeorgjia dhe Kazakistani).

Nga 35 vende dhe zona që raportuan shpërndarjen gjeografike të gripit: dhjetë raportuan shpërndarje rajonale ose të përhapur të gripit.

ASHPËRSIA E INFEKSIONIT

Në të gjithë rajonin, përqindja e të gjitha mostrave nga pacientët që paraqiten në pikat sentinel sari që kanë rezultuar pozitive për:

Virusin e gripit ishte 9% krahasuar me 8% në javën e mëparshme. Pozitiviteti median nga 14 vende dhe zona që raportuan të dhëna ishte 4% (varia: 0%–28%). Ndër mostrat SARI, kishte 84 detektime të virusit të gripit të raportuara nga rrjeti këtë javë, të gjitha ishin të tipit A. Nga 42 që ishin nën-tipizuar, 88% ishin A(H3) dhe 12% ishin A(H1)pdm09.

SARS-CoV-2 ishte 4% krahasuar me 7% në javën e mëparshme. Pozitiviteti median nga 12 vende dhe zona që raportuan të dhëna ishte 5% (varia: 0%–13%).

RSV mbeti në 3% krahasuar me javën e mëparshme. Pozitiviteti median nga 11 vende dhe zona që raportuan të dhëna ishte 0% (varia: 0%–17%).

Nga 10 vende ose zona që raportuan të dhëna për shtrimet spitalore ose në ICU jo-sentinel, 1 raportoi rritje të shtrimeve (Irlanda).

Normat e vdekshmërisë nga COVID-19 mbetën të ulëta midis 41 vendeve që raportuan të dhëna.

Vlerësimet e kombinuara të EuroMOMO për vdekshmërinë nga të gjitha shkaqet për vendet europiane pjesëmarrëse treguan nivele të pritshme të vdekshmërisë në të gjitha grupmoshat. Të dhënat nga 26 vende europiane ose rajone nën-kombëtare u përfshinë në analizën e kësaj jave.

KARAKTERIZIMI I VIRUSIT

GRIPI

Aktiviteti u dominua nga A(H3) në survejancën sentinel dhe jo-sentinel që nga java 40/2025. Nga 199 viruset e karakterizuara të raportuara që nga fillimi i sezonit, përqindja sipas tipit ishte:

A(H3): 71% (40% ishin pjesë e kladës A/Croatia/10136RV/2023; 27% ishin pjesë e kladës A/Norway/8765/2025).

A(H1)pdm09: 28% (68% ishin pjesë e kladës A/Missouri/11/2025; 29% ishin pjesë e kladës A/Victoria/4897/2022; dhe 3% ishin pjesë e kladës A/Hungary/286/2024).

B/Vic: 2% (67% ishin pjesë e kladës B/Catalonia/2279261NS/2023; dhe 33% ishin pjesë e kladës B/Austria/1359417/2021).

SARS-COV-2

Midis javëve 43/2025 dhe 44/2025, 8 vende dhe zona raportuan informacion të mjaftueshëm për të mundësuar llogaritjen e frekuencës relative të varianteve specifike. Midis këtyre vendeve dhe zonave, përqindja mediane (varia) e të gjitha izolimeve virale të sekuencuara në nivel kombëtar që janë variante aktuale ose të mëparshme me rëndësi ishte:

XFG: 78% (41%–95% nga 8 vende dhe zona).

NB.1.8.1: 11% (0%–18% nga 6 vende dhe zona).

BA.2.86: 4% (0%–44% nga 7 vende dhe zona).

Shënim: Izolimet JN.1 janë të përfshira në BA.2.86.

Varianti më i zakonshëm i SARS-CoV-2 në GISAID për Rajonin European në nëntor deri tani ishte: XFG (35%); XFG.3 (35%); XFG.3.4.1 (12%); JN.1.40 (8%); B (4%); NB.1.8.1 (4%); dhe XFG.3.4.1 (4%) (n=26).

Rekomandimet e OBSH për vaksinën gripale 2024/2025

OBSH informoi në Shkurt 2025 rekomandimin për përbërjen e vaksinës së gripit që do të përdoret në sezonin e ardhshëm 2025-2026 si vaksinë trivalente për hemisferin verior si më poshtë:

- o Vaksina të prodhuara në vezë:
 - ☐ A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus;
 - ☐ A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-like virus; dhe
 - ☐ B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus.
- o Vaksina të prodhuara në kultura qelizore ose me procese rekombinimi:
 - ☐ A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09-like virus;
 - ☐ A/Massachusetts/18/2022 (H3N2)-like virus; dhe
 - ☐ B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus.

COVID-19 SITUATA NË JAVA 45, VITI 2025 NË VENDIN TONË


Gjatë javës së dyzet e gjashtë (10 - 16 nëntor 2025) numri i rasteve të konfirmuara është 13 raste dhe numri i vdekjeve është 0.

Tabela 2. Rastet javore me COVID - 19

	Java 46		Java 45
Raste të reja të konfirmuara	13	↘	18
Incidenca (Nr. rastesh/100000 banorë)	0.5	↘	0.7
Shtrimet në spital (nr. rastesh)	3	↗	0

Rasti është konfirmuar me PCR dhe është raportuar ILI.



Grafiku 12. Shpërndarja e rasteve sipas grupmoshave (java 46; java 45)




Java 46 karakterizohet nga rritje në moshat e reja dhe ulje në moshat mbi 45 vjeç.

Piku është te 0–4 vjeç dhe 25–34 vjeç, që tregojnë një qarkullim më aktiv tek fëmijët e vegjël dhe të rriturit e rinj. Grupmoshat e mesme dhe të moshuarit paraqesin rënie krahasuar me javën 45, veçanërisht 45–64 vjeç, ku rënia është më e qartë.

3 raste janë shtruar në spital në këtë javë.

Grafiku 13. Shpërndarja e testimeve dhe pozitiviteti sipas muajve

Në grafikun më lart tregohet shpërndarja e testimeve për COVID-19 sipas muajve, llojit të testit dhe pozitiviteti për test e muaj. Gjatë muajve tetor ka një rënie si të testimeve ashtu dhe rasteve me COVID-19 ku peshën më të madhe e mbajnë testimet e shpejta.

Grafiku 14. Shpërndarja e rasteve sipas bashkive (java 46)

Shpërndarja e rasteve sipas bashkive të banimit tregon që rastet më të shumta janë në bashkitë Tiranë dhe Vlorë.