



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
NJËSIA BAZË (DEPARTAMENTI) I EPIDEMIOLOGJISË DHE KONTROLLIT TË
SËMUNDJEVE INFEKTIVE

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 13
23 mars – 29 mars 2026

Për këtë javë, kanë raportuar 36 Njësi Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas çdo NJVKSH-je

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	34 / 35	97%
		Kavajë	10 / 10	100%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	6 / 7	86%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	7 / 7	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	18 / 19	95%
		M. Madhe	5 / 6	83%

		Pukë	11 / 11	100%
		Kukës	13 / 14	93%
		Has	4 / 5	80%
		Tropojë	9 / 9	100%
	Lezhë	Lezhë	10 / 10	100%
		Kurbini	4 / 5	80%
		Mirditë	4 / 6	67%
	Vlorë	Vlorë	21 / 21	100%
		Sarandë	10 / 10	100%
		Delvinë	1 / 5	20%
VLORE	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastër	Gjirokastër	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	416 / 429	97%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 13

	JAVA 13
Diarre pa gjak	1038
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. të sipërme	7431
Inf. Resp. të poshtme	3493
Rash me temperaturë	23
Verdhëza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 javë)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut te neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	402
% e Njësive Raportuese	97% (416/429)

Rash me temperaturë



Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog, rastet e mëposhtme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për variçelë:

Tiranë – 10 raste

Fier– 9 raste


Lezhe–3 raste

Puke–1 rast


Grafiku 1. Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet rritje në javën 13 të vitit 2026 krahasuar me javën paraardhëse, java 12.

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa gjak sipas grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 13 të vitit 2026 krahasuar me javën paraardhëse, java 12.

Grafiku 5. Krahassimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet rritje në javën 13 krahasuar me javën paraardhëse, duke mbetur brenda kufijve të aktivitetit sezonal normal.

Grafiku 6. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” në javët 45 – 13 të sezonit 2024-2025 dhe sezonit 2025-2026. Numri i rasteve.




Në javën 13 të vitit 2026 vërehet një rritje e numrit të Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme.

Grafiku 7. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas grup-moshës. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas NJVKSH-ve në javën 12/2026 dhe 13/ 2026. Incidenca (raste/10.000).




Vërehet një rritje e infeksioneve respiratore në disa NJVKSH, por aktiviteti i gripit këtë javë paraqitet në rënie; megjithatë, ai mbetet i përhapur në të gjithë territorin e vendit.

Grafiku 9. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10-13 të sezonit 2024-2025 dhe sezonit 2025-2026. Numri i rasteve.



Në javën 13 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër më i ulët i këtyre infeksioneve, krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 10. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH-ve në javën 12-13/2026 Incidenca (raste/10.000).



Vërehet një rritje e rasteve me diarre, veçanërisht në NJVKSH Gramsh, Bulqizë dhe Dibër, ku situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Kjo rritje mund të shpjegohet pjesërisht me faktin se, krahasuar me një javë më parë, numri i qendrave shëndetësore që kanë raportuar ka qenë më i lartë.

Ngjarje ndërkombëtare

Dengue –Monitorimi i shpërthimeve globale – Përditësim mujor

- Që nga fillimi i vitit 2026, dhe që nga 23 marsi 2026, mbi 500 000 raste të dengës dhe mbi 100 vdekje të lidhura me dengën janë raportuar në nivel global, sipas informacionit nga burime të disponueshme publikisht. Ky është një rënie krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2025.
- Në vitin 2026, nuk janë raportuar raste në BE/EEA duke përjashtuar rajonet më të largëta. Rastet janë raportuar nga Martinika, Guadelupa, Reunioni dhe nga Guiana Franceze (rajonet më të largëta franceze).

Sëmundja e virusit Chikungunya –Monitorimi i shpërthimeve globale –Përditësim mujor

- Që nga fillimi i vitit 2026, dhe që nga 28 shkurti 2026 janë zbuluar 32 758 raste të sëmundjes së virusit Chikungunya (CHIKVD) dhe nëntë vdekje të shoqëruara nga 18 vende (duke mos përfshirë vendet dhe territoret e BE/EEA-së).
- Rastet e raportuara në shkurt janë rritur krahasuar me janarin, kur u raportuan 4 361 raste. Vdekjet janë rritur në shkurt krahasuar me muajin e kaluar, kur u raportuan dy vdekje.

Sëmundja meningokoksike invazive - Angli – 2026

- Që nga 26 marsi 2026, është raportuar një shpërthim i sëmundjes meningokoksike invazive (IMD) në Kent, Angli. Shpërthimi përfshin gjithsej 23 raste, 22 raste (përfshirë dy vdekje) në MB dhe një rast në Francë. Në Mbretërinë e Bashkuar, rasti më i hershëm i njohur u sëmur të hënën më 9 mars, dhe më i fundit më 16 mars 2026. Sipas autoriteteve franceze, i vetmi rast i konfirmuar në Francë ishte një individ që ndoqi Universitetin e Kentit para se të kthehej në Francë.
- Fillimi i rastit të fundit të raportuar ishte 16 marsi 2026.
- Hetimet e Agjencisë së Sigurisë Shëndetësore të Mbretërisë së Bashkuar (UKHSA) kanë konfirmuar se 20 (nga 20) raste të konfirmuara në laborator janë serogrupi B i meningokokut.
- UKHSA po i përgjigjet shpërthimit dhe po zbaton masa reagimi ndaj shëndetit publik për të parandaluar raste dhe transmetim të mëtejshëm.

- Shpërthimi lidhet me një klub nate në Canterbury (Club Chemistry) me ekspozim gjatë periudhës 5-7 mars, si dhe me kampusin e Universitetit të Kentit.

Zbulimi i virusit të dengues te mushkonjat - Zvicër – 2024

- Një grup mushkonjash Aedes të mbledhura në kantonin e Bazel-City, Zvicër, në vitin 2024 rezultuan pozitive për virusin e dengues.
- Ky zbulim përfaqëson identifikimin e parë të publikuar të virusit të dengues te mushkonjat në veri të Alpeve, megjithëse transmetimi autokton i dengues është dokumentuar më në veri në rajonin e Parisit në vitin 2023.
- Gjatë periudhës së specifikuar, nuk u raportuan raste të dengues në Bazel-City në vitin 2024.

Zbulimi i Aedes aegypti – Luksemburg – 2025

- Në korrik 2025, ADN-ja e Aedes aegypti u zbulua në katër vezë mushkonjash të mbledhura në një stacion autostrade në Berchem, Luksemburg. Në vitin 2023, ADN-ja mjedisore e Aedes aegypti u zbulua në një stacion mallrash aty pranë në Bettembourg.
- Deri më sot nuk janë gjetur mushkonja të rritura. Provat tregojnë se specia është transportuar në Luksemburg nëpërmjet trafikut rrugor; mundësia e vendosjes konsiderohet e ulët për shkak të tolerancës së kufizuar të specieve ndaj të ftohtit.

Shpërthimi i fruthit në Letoni 2026

- Letonia raportoi shpërthimin e parë të fruthit që nga viti 2018. Që nga 26 marsi 2026, janë identifikuar 28 raste të lidhura epidemiologjikisht, me transmetim të përqendruar në shkollën e rastit indeks dhe mbi 1,000 kontakte të gjurmua në mjedise të shumta.
- Shumica e rasteve të konfirmuara pediatrike janë kontakte shkollore të pavaksinuara të rastit indeks
- Autoritetet letoneze po zbatojnë izolimin, gjurmimin e gjerë të kontakteve, ndjekjen e individëve të ekspozuar, komunikimin e rrezikut dhe po japin udhëzime shëndetësore për të zvogëluar përhapjen.
- Rreziku kombëtar vlerësohet si i moderuar deri në të lartë, veçanërisht në mesin e personave jo-imun.
- Rreziku i fruthit në Evropë mbetet i pandryshuar, me rrezik të moderuar për foshnjat <12 muajsh, fëmijët e vegjël dhe individët me imunitet të kompromentuar, rrezik të ulët-të moderuar për personat e moshuar të pavaksinuar dhe shumë të ulët për personat e imunizuar.
- ECDC rekomandon mbylljen e boshllëqeve në imunitet, forcimin e mbikëqyrjes, përmirësimin e ndërgjegjësimit klinik, sigurimin e vaksinimit të punonjësve të kujdesit shëndetësor, rritjen e pranimit të vaksinave dhe përgatitjen e udhëtarëve përpara lëvizjes së festave të pranverës.

Rast në njerëz i gripit të shpendëve A(H9N2) - Itali (i importuar) - 2026

- Një rast njerëzor i infeksionit të gripit të shpendëve A(H9N2) është raportuar në rajonin e Lombardisë të Italisë, tek një udhëtar që kthehej nga një vend jo-evropian ku virusi është identifikuar më parë tek shpendët. Ky është rasti i parë njerëzor i gripit të shpendëve A(H9N2) i raportuar në BE/EEA.
- Bazuar në informacionin e ndarë nga autoritetet e shëndetit publik të Italisë dhe njohuritë mbi epidemiologjinë e virusit, ECDC aktualisht vlerëson rrezikun për popullatën e përgjithshme në BE/EEA të gripit A(H9N2) në lidhje me këtë ngjarje si shumë të ulët.
- ECDC është në kontakt me autoritetet në Itali, po monitoron nga afër situatën dhe do të rivlerësojë rrezikun sapo të bëhen të disponueshme më shumë informacione.