



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
NJËSIA BAZË (DEPARTAMENTI) I EPIDEMIOLOGJISË DHE KONTROLLIT TË
SËMUNDJEVE INFEKTIVE

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 14
30 mars – 05 Prill 2026

Për këtë javë, kanë raportuar 36 Njësi Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas çdo NJVKSH-je

Perqindja e plotesueshmerise				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	34 / 35	97%
		Kavajë	10 / 10	100%
	Durrës	Durrës	19 / 20	95%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	8 / 9	89%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	4 / 7	57%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	6 / 7	86%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	18 / 19	95%
		M. Madhe	5 / 6	83%

	Kukës	Pukë	10 / 11	91%
		Kukës	11 / 14	79%
		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	9 / 9	100%
	Lezhë	Lezhë	9 / 10	90%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	3 / 6	50%
	Vlorë	Vlorë	21 / 21	100%
		Sarandë	8 / 10	80%
		Delvinë	5 / 5	100%
VLORE	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	410 / 429	96%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 14



	JAVA 14
Diarre pa gjak	1206
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. të sipërme	7684
Inf. Resp. të poshtme	3209
Rash me temperaturë	20
Verdhëza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 javë)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut te neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	410
% e Njësive Raportuese	96% (410/429)

Rash me temperaturë



Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog, rastet e mëposhtme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për variçelë:

Tiranë – 12 raste

Fier– 8 raste


Grafiku 1. Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqitet thujtë e njëjtë në javën 14 të vitit 2026 krahasuar me javën paraardhëse, atë 13.

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa gjak sipas javëve**Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa gjak sipas grup-moshave**


Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 14 të vitit 2026 krahasuar me javën paraardhëse, java 13.

Grafiku 5. Krahاسimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme thuhet se është e njëjtë në javën 14 krahasuar me javën paraardhëse, gjithsesi duke patur një rritje në krahasim me javën 12 që tregon për një rritje të infeksioneve respiratore por duke mbetur në intensitetet të ulët sezonal.

Grafiku 6. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” në javët 45 – 14 të sezonit 2024-2025 dhe sezonit 2025-2026. Numri i rasteve.




Në javën 14 të vitit 2026 vërehet një situatë thuajse e njëjtë e numrit të Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme gjë e cila duket më e qartë në grafikun e mëposhtëm sipas grup moshave ku vërehet një rritje në grupmoshën ndën 1 vjeç.

Grafiku 7. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas grup-moshës. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas NJVKSH-ve në javën 13/2026 dhe 14/ 2026. Incidenca (raste/10.000).




Vërehet një rritje e infeksioneve respiratore në disa NJVKSH, por aktiviteti i tyre këtë javë mbetet thuajse i njëjtë; megjithatë, ato mbeten të përhapura në të gjithë territorin e vendit.

Grafiku 9. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 10-14 të sezonit 2024-2025 dhe sezonit 2025-2026. Numri i rasteve.



Në javën 14 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, por këtë vit vërehet një numër më i ulët i këtyre infeksioneve, krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 10. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH-ve në javën 13-14/2026 Incidenca (raste/10.000).



Vërehet një rritje e rasteve me diarje, veçanërisht në NJVKSH Pogradec, Tropojë dhe Dibër, ku situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme.

Ngjarje ndërkombëtare

Transmetimi i HIV-1 rezistent ndaj frenuesit të integrazës – Shumë vende – 2026

- Që nga marsi i vitit 2026, 33 persona nga Belgjika, Danimarka, Franca, Greqia, Hungaria, Lituania, Luksemburgu dhe Holanda u raportuan si të diagnostikuar midis viteve 2014 dhe 2025 me infeksion HIV që mbante rezistencë të nivelit të lartë ose të madh ndaj trajtimit antiretroviral frenuesit e transferimit të fijeve të integrazës së klasës (INSTI). Irlanda, Norvegjia, Rumania dhe Spanja raportuan zero raste të tilla. Në vendet që raportuan raste, të gjithë ishin të patrajtuar, dhe disa kishin rezistencë shtesë ndaj frenuesit të transkriptazës së kundërt nukleozidik dhe jo-nukleozidik.
- Numri i rasteve të raportuara me rezistencë të nivelit të lartë ndaj INSTI është shumë i vogël në krahasim me numrin e personave të diagnostikuar rishtazi me HIV gjatë kësaj periudhe. Prandaj, nuk ka aktualisht prova për transmetim të përhapur të HIV rezistent ndaj INSTI në BE/EEA.
- Monitorimi i afërt është thelbësor me përdorimin në rritje të profilaksisë para ekspozimit ndaj kabotegravirit me veprim të gjatë (PrEP), pasi rezistenca në zhvillim ndaj INSTI mund të ndikojë si në trajtim ashtu edhe në parandalim, duke përfshirë rezistencën e mundshme kryq me dolutegravirin e INSTI-së.

Gripi A(H5N1) – Shumëvendësh (Botë) – Monitorimi i rasteve tek njerëzit

- Më 31 Mars 2026, Ministria e Shëndetësisë e Kamboxhias raportoi një rast të ri tek njerëzit me infeksion nga virusi i gripit të shpendëve A(H5N1) tek një fëmijë nga Distrikti Banteay Ampil në provincën Oddar Meanchey.
- Pacienti po izolohet dhe po merr trajtim mjekësor në spital.
- Nuk janë zbuluar raste të reja midis kontakteve të ngushta të rastit.
- Pacienti ka pasur ekspozim ndaj shpendëve të sëmurë dhe të ngordhur para fillimit të sëmundjes.
- Që nga viti 2003, janë raportuar gjithsej 997 raste të konfirmuara tek njerëzit me A(H5N1) në të gjithë botën, përfshirë 477 vdekje (shkalla e vdekshmërisë së rasteve (CFR): 48%).
- Vlerësimi i rrezikut i ECDC për A(H5N1) mbetet i pandryshuar. Në përgjithësi, rreziku që lidhet me gripin zoonotik për popullatën e përgjithshme në BE/EEA konsiderohet i ulët.

Koronavirusi i sindromës respiratore të Lindjes së Mesme (MERS-CoV)– Përditësim mujor

- Që nga përditësimi i mëparshëm më 2 mars 2026, dhe që nga 30 marsi 2026, nuk janë raportuar raste të reja MERS nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ose autoritetet kombëtare shëndetësore.

- Që nga fillimi i vitit 2026, dhe që nga 30 marsi 2026, nuk janë raportuar raste të reja MERS nga OBSH ose autoritetet kombëtare shëndetësore.
- Probabiliteti i transmetimit të qëndrueshëm nga njeriu te njeriu midis popullatës së përgjithshme në Evropë mbetet shumë i ulët, dhe ndikimi i sëmundjes në popullatën e përgjithshme gjithashtu konsiderohet i ulët. Situata aktuale e MERS-CoV paraqet një rrezik të ulët për BE/EEA-në.

Kolera –Monitorimi i shpërthimeve globale – Përditësim mujor

- Që nga 1 janari 2026 dhe deri më 30 mars 2026, janë raportuar 44 602 raste të kolerës, përfshirë 496 vdekje, në të gjithë botën.
- Që nga 25 shkurti 2026 dhe deri më 30 mars 2026, janë raportuar 17 723 raste të reja të kolerës, përfshirë 212 vdekje të reja, në të gjithë botën.
- Pesë vendet që raportojnë më shumë raste janë Afganistani (7 758), Republika Demokratike e Kongos (5 775), Mozambiku (2 496), Sudani i Jugut (455) dhe Somalia (386).
- Pesë vendet që raportojnë më shumë vdekje të reja janë Republika Demokratike e Kongos (176), Mozambiku (20), Sudani i Jugut (6), Angola (3) dhe Afganistani (2).
- Rastet e kolerës kanë vazhduar të raportohen në Afrikë, Azi, Lindjen e Mesme dhe Amerikë. Rreziku i infeksionit të kolerës tek udhëtarët që vizitojnë këto vende mbetet i ulët, edhe pse importimi sporadik i rasteve në BE/EEA është i mundur.