



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
NJËSIA BAZË (DEPARTAMENTI) I EPIDEMIOLOGJISË DHE KONTROLLIT TË
SËMUNDJEVE INFEKTIVE

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 15
06 prill – 12 Prill 2026

Për këtë javë, kanë raportuar 36 Njësi Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas çdo NJVKSH-je

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	34 / 35	97%
		Kavajë	10 / 10	100%
	Durrës	Durrës	17 / 20	85%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	8 / 9	89%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	5 / 7	71%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	14 / 15	93%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	7 / 7	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%

	Kukës	Pukë	11 / 11	100%
		Kukës	13 / 14	93%
		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	8 / 9	89%
	Lezhë	Lezhë	10 / 10	100%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	3 / 6	50%
	Vlorë	Vlorë	21 / 21	100%
		Sarandë	7 / 10	70%
		Delvinë	5 / 5	100%
VLORE	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	413 / 429	96%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 15

	JAVA 15
Diarre pa gjak	1156
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. të sipërme	7015
Inf. Resp. të poshtme	3618
Rash me temperaturë	16
Verdhëza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 javë)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut te neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	413
% e Njësive Raportuese	96% (413/429)

Rash me temperaturë



Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog, rastet e mëposhtme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për variçelë:

Tiranë – 9 raste



Fier– 4 raste

Diber – 2 raste

Kavaje – 1 rast


Grafiku 1. Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet ulje në javën 15 të vitit 2026 krahasuar me javën paraardhëse, java 14.

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa gjak sipas javëve**Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa gjak sipas grup-moshave**


Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ulje në javën 15 të vitit 2026 krahasuar me javën paraardhëse, java 14.

Grafiku 5. Krahاسimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet ulje në javën 15 krahasuar me javën paraardhëse, duke mbetur ne intestitet te ulet sezonal.

Grafiku 6. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” në javët 05 – 15 të sezonit 2024-2025 dhe sezonit 2025-2026. Numri i rasteve.




Në javën 15 të vitit 2026 vërehet një ulje e numrit të Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme.

Grafiku 7. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas NJVKSH-ve në javën 14/2026 dhe 15/ 2026. Incidenca (raste/10.000).




Vërehet një rritje e infeksioneve respiratore në disa NJVKSH, por aktiviteti i gripit këtë javë paraqitet në rënie; megjithatë, ai mbetet i përhapur në të gjithë territorin e vendit.

Grafiku 9. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 05-15 të sezonit 2024-2025 dhe sezonit 2025-2026. Numri i rasteve.



Në javën 15 vërehet prirje në ulje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër më i ulët i këtyre infeksioneve, krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 10. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH-ve në javën 14-15/2026 Incidenca (raste/10.000).



Vërehet një rritje e rasteve me diarre, veçanërisht në NJVKSH Shkodër, Gramsh dhe Dibër, ku situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme.

Ngjarje ndërkombëtare

Rast në njerëz i gripit të shpendëve A(H7N7) - Tajvan - 2026

- Më 3 prill 2026, Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) të Tajvanit raportuan një rast të virusit të gripit A(H7N7) tek një burrë i moshuar i cili kishte pasur ekspozim ndaj shpendëve dhe tani është larguar nga spitali.
- Ky është rasti i parë i gripit të shpendëve A(H7N7) i raportuar që nga viti 2013. Rastet janë raportuar më parë në Itali në vitin 2013 dhe në Holandë në vitin 2003.
- Në përgjithësi, rreziku i lidhur me gripin zoonotik, përfshirë gripin e shpendëve A(H7N7), për popullatën e përgjithshme në BE/EEA konsiderohet i ulët.

Epidemia e Denges në Kaledoninë e Re

- Kaledonia e Re ka raportuar shpërthimin e parë të denges që nga viti 2019.
- Nuk është raportuar rritje e ashpërsisë së sëmundjes. Mundësia aktuale e transmetimit të virusit të dengut në Evropën kontinentale mbetet shumë e ulët; mundësia e infeksionit për udhëtarët në Kaledoninë e Re është e moderuar.
- Në Evropë, ofruesit e kujdesit shëndetësor, duke përfshirë klinikat e mjekësisë së udhëtimit, duhet të rrisin ndërgjegjësimin midis udhëtarëve që vizitojnë Kaledoninë e Re. Klinikistët duhet të marrin në konsideratë Dengen tek pacientët që kthehen nga Kaledonia e Re me simptoma të përputhshme.