



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
NJËSIA BAZË (DEPARTAMENTI) I EPIDEMIOLOGJISË DHE KONTROLLIT TË
SËMUNDJEVE INFEKTIVE

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 16
13 prill – 19 Prill 2026

Për këtë javë, kanë raportuar 36 Njësi Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas çdo NJVKSH-je

Përqindja e plotësueshmërisë				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 35	100%
		Kavajë	10 / 10	100%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	26 / 27	96%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	7 / 7	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%

	Kukës	Pukë	11 / 11	100%
		Kukës	14 / 14	100%
		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	9 / 9	100%
	Lezhë	Lezhë	10 / 10	100%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	6 / 6	100%
	Vlorë	Vlorë	21 / 21	100%
		Sarandë	10 / 10	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
VLOREË	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastrë	Gjirokastrë	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	428 / 429	99.7%

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 16

	JAVA 15
Diarre pa gjak	1145
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. të sipërme	7275
Inf. Resp. të poshtme	2958
Rash me temperaturë	29
Verdhëza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 javë)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut te neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	428
% e Njësive Raportuese	99.7% (428/429)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog, rastet e mëposhtme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për variçelë:

Tiranë – 16 raste



Fier– 4 raste

Diber – 2 raste



Vlore – 5 raste

Pogradec – 1 rast

Kurbin – 1 rast


Grafiku 1. Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet ulje në javën 16 të vitit 2026 krahasuar me javën paraardhëse, java 15.

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa gjak sipas javëve**Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa gjak sipas grup-moshave**


Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ulje në javën 16 të vitit 2026 krahasuar me javën paraardhëse, java 15.

Grafiku 5. Krahاسimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Pirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet ulje në javën 16 krahasuar me javën paraardhëse, duke mbetur në intensitet të ulët sezonal.

Grafiku 6. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” në javët 05 – 16 të sezonit 2024-2025 dhe sezonit 2025-2026. Numri i rasteve.




Në javën 16 të vitit 2026 vërehet një ulje e numrit të Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme.

Grafiku 7. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas NJVKSH-ve në javën 15/2026 dhe 16/ 2026. Incidenca (raste/10.000).




Vërehet një ulje e infeksioneve respiratore në pjesën më të madhe të NJVKSH -ve dhe aktiviteti i gripit në total këtë javë paraqitet në rënie.

Grafiku 9. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 05-16 të sezonit 2024-2025 dhe sezonit 2025-2026. Numri i rasteve.



Në javën 16 vërehet prirje në ulje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër më i ulët i këtyre infeksioneve, krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 10. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH-ve në javën 15-16/2026 Incidenca (raste/10.000).



Vërehet një rritje e rasteve me diarre, veçanërisht në NJVKSH Tepelene, Mallakaster dhe Delvine, ku situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme.

Ngjarje ndërkombëtare

Fruthi –Monitorimi i shpërthimeve evropiane – monitorim mujor

- Në shkurt 2026, 11 vende të BE/EEA raportuan 139 raste të fruthit. Pesëmbëdhjetë vende raportuan zero raste.
- Gjatë periudhës së fundit 12-mujore, gjashtë vdekje që i atribuohen fruthit u raportuan në ECDC nga Franca (4), Rumania (1) dhe Holanda (1).
- Në përgjithësi, numri i rasteve u ul krahasuar me muajt e mëparshëm.
- Mbikëqyrja plotësuese e inteligjencës epidemike u krye më 15 dhe 16 prill 2026. Shpërthime janë raportuar në Bullgari dhe Letoni. Raste sporadike dhe grupe u raportuan në disa vende të BE/EEA.

Sëmundja e virusit Zika e lidhur me udhëtimin - Francë (përveç Indonezisë) - 2026

- Franca raportoi gjithsej 11 raste të ZIKV të lidhura me udhëtimin të lidhura me Indonezinë midis korrikut 2025 dhe marsit 2026, duke përfshirë katër raste të zbuluara në fillim të vitit 2026.
- Pavarësisht vëllimeve të larta dhe në rritje të udhëtimeve nga Indonezia në BE/EEA që nga viti 2022, nuk është vërejtur asnjë rritje korresponduese e rasteve të importuara të ZIKV nga vendet e tjera të BE/EEA.
- Mundësia e infeksionit ZIKV për udhëtarët në Indonezi është e ulët; mundësia e transmetimit të mëtejshëm në Evropën kontinentale pas hyrjes nga një udhëtar viremik është aktualisht shumë e ulët.
- Në Evropë, klinikat e mjekësisë së udhëtimit duhet të mbajnë ndërgjegjësimin e përgjithshëm për arbovirusin për udhëtarët në Indonezi, veçanërisht gratë shtatzëna dhe individët që planifikojnë shtatzëninë. Klinikët duhet të marrin në konsideratë infeksionin ZIKV në udhëtarët që kthehen dhe paraqiten me simptoma të përputhshme.

Sëmundja e virusit Chikungunya – Guiana Franceze, Francë – 2026

- Virusi chikungunya është në qarkullim të vazhdueshëm në Guianën Franceze, me mbi 85 raste të raportuara që nga janari 2026.
- Mundësia aktuale e infeksionit me virusin chikungunya për udhëtarët në Guianën Franceze vlerësohet si e ulët; mundësia e transmetimit të mëtejshëm në Evropën kontinentale pas hyrjes nga një udhëtar viremik është aktualisht shumë e ulët.
- Udhëtarëve duhet t'u këshillohet të marrin masa të përforcuara parandaluese të pickimit të mushkonjave. Vaksinimi mund të merret në konsideratë bazuar në rekomandimet kombëtare.

Sëmundjet e shkaktuara nga virusi Chikungunya – Surinami – 2026

- Në fund të vitit 2025, Surinami raportoi rastin e parë autokton të sëmundjes së virusit chikungunya që nga viti 2016. Midis 1 janarit dhe mesit të marsit, janë raportuar 2 579 raste të sëmundjes së virusit chikungunya.
- Që nga janari i vitit 2026, një shtet anëtar i BE-së vërejti gjithashtu një rritje të dukshme të zbulimeve të virusit chikungunya midis udhëtarëve që kthehen nga Surinami dhe Paramaribo në veçanti.
- Mundësia e infektimit me sëmundjen e virusit chikungunya për udhëtarët në Surinam vlerësohet si e moderuar; mundësia e transmetimit të mëtejshëm në Evropën kontinentale pas futjes së një udhëtari viremik është aktualisht shumë e ulët.
- Në Evropë, klinikat e mjekësisë së udhëtimit duhet të mbajnë ndërgjegjësimin e përgjithshëm për arbovirusin për udhëtarët në Surinam. Klinikistët duhet të marrin në konsideratë sëmundjen e virusit chikungunya tek udhëtarët që kthehen dhe paraqesin simptoma të përputhshme.