



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
NJËSIA BAZË (DEPARTAMENTI) I EPIDEMIOLOGJISË DHE KONTROLLIT TË
SËMUNDJEVE INFEKTIVE

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 17
20 prill – 26 Prill 2026

Gjatë javës 17, kanë raportuar 36 Njësi Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.

Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas çdo NJVKSH-je

Perqindja e plotesueshmerise				
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 35	100%
		Kavajë	10 / 10	100%
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%
		Krujë	6 / 6	100%
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%
		Mat	13 / 13	100%
		Bulqizë	9 / 9	100%
ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
		Librazhd	11 / 11	100%
		Gramsh	8 / 8	100%
		Peqin	7 / 7	100%
	Korçë	Korçë	18 / 18	100%
		Pogradec	9 / 9	100%
		Devoll	6 / 6	100%
		Kolonjë	4 / 4	100%
	Berat	Berat	15 / 15	100%
		Kuçovë	4 / 4	100%
		Skrapar	7 / 7	100%
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%
		M. Madhe	6 / 6	100%

	Kukës	Pukë	11 / 11	100%
		Kukës	14 / 14	100%
		Has	5 / 5	100%
		Tropojë	9 / 9	100%
	Lezhë	Lezhë	10 / 10	100%
		Kurbin	5 / 5	100%
		Mirditë	5 / 6	83%
	Vlorë	Vlorë	21 / 21	100%
		Sarandë	10 / 10	100%
		Delvinë	5 / 5	100%
VLORE	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	6 / 9	67%
	Gjirokastër	Gjirokastër	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	425 / 429	99%

Vihet re nënraportim në Mallakastër

Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 17

	JAVA 17
Diarre pa gjak	1245
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. të sipërme	7439
Inf. Resp. të poshtme	3176
Rash me temperaturë	26
Verdhëza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 javë)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut te neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	425
% e Njësive Raportuese	99% (425/429)

Rash me temperaturë


Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog, rastet e mëposhtme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për variçelë:

Tiranë – 10 raste


Fier– 13 raste

Vlore – 3 raste

Grafiku 1. Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas javëve




Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme sipas grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet rritje në javën 17 të vitit 2026 krahasuar me javën paraardhëse, java 16.

Grafiku 3. Prirja në kohë i Diarreve pa gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa gjak sipas grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 17 të vitit 2026 krahasuar me javën paraardhëse, java 16.

Grafiku 5. Krahasoni i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme paraqet rritje të lehtë në javën 17 krahasuar me javën paraardhëse, por duke mbetur në intensitet të ulët sezonal.

Grafiku 6. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” në javët 05 – 17 të sezonit 2024-2025 dhe sezonit 2025-2026. Numri i rasteve.




Në javën 17 të vitit 2026 vërehet një rritje e numrit të Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme.

Grafiku 7. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 8. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtme” sipas NJVKSH-ve në javën 16/2026 dhe 17/ 2026. Incidenca (raste/10.000).




Vërehet një rritje e infeksioneve respiratore në disa NJVKSH por aktiviteti i gripit të konfirmuar në total këtë javë paraqitet në rënie.

Grafiku 9. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 05-17 të sezonit 2024-2025 dhe sezonit 2025-2026. Numri i rasteve.



Në javën 17 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”, këtë vit vërehet një numër më i madh i këtyre infeksioneve, krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 10. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH-ve në javën 16-17/2026 Incidenca (raste/10.000).



Vërehet një rritje e rasteve me diarre, veçanërisht në NJVKSH Kolonjë, Shkoder dhe Gramsh, ku situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme.

Ngjarje ndërkombëtare

Gripi A(H5N1) – Shumëvendësh (Botë) – Monitorimi i rasteve tek njerëzit

- Më 21 prill 2026, Ministria e Shëndetësisë e Kamboxhias raportoi një rast të ri tek njerëzit me infeksion nga virusi i gripit të shpendëve A(H5N1) tek një grua e rritur nga distrikti Romduol, provinca Svay Rieng.
- Pacienti po izolohet dhe po merr trajtim mjekësor në spital.
- Pacienti ka pasur ekspozim ndaj shpendëve të sëmurë dhe të ngordhur para fillimit të sëmundjes.
- Që nga viti 2003, janë raportuar gjithsej 998 raste të konfirmuara tek njerëzit me A(H5N1) në të gjithë botën, përfshirë 477 vdekje (shkalla e vdekshmërisë së rasteve (CFR): 48%).
- Vlerësimi i rrezikut i ECDC për A(H5N1) mbetet i pandryshuar. Në përgjithësi, rreziku që lidhet me gripin zoonotik për popullatën e përgjithshme në BE/EEA konsiderohet i ulët.

Gripi i shpendëve A(H9N2) – Shumëvendësh (Botë) – Monitorimi i rasteve tek njerëzit

- Që nga 22 prilli 2026, pesë raste të reja tek njerëzit me infeksion nga virusi i gripit të shpendëve A(H9N2) u raportuan në Kinë, me fillimin e simptomave në janar, shkurt dhe mars 2026.
- Katër raste ishin tek fëmijë pesë vjeç ose më të vegjël nga provinca të ndryshme dhe një i rritur në të 60-at.
- Informacioni mbi ekspozimin nuk është dhënë publikisht.
- Në përgjithësi, 201 raste tek njerëzit me gripin e shpendëve A(H9N2), përfshirë dy vdekje, janë raportuar globalisht që nga viti 1998 nga 11 vende.
- Rreziku për shëndetin e njeriut në BE/EEA aktualisht konsiderohet shumë i ulët.

Shpërthimi i Salmonella Bovismorficans – Shumëvendësh – 2026

- Një shpërthim shumëvendësh i Salmonella Bovismorbicans është zbuluar me rreth 50 raste të konfirmuara nga janari deri në prill 2026.
- Të gjitha rastet janë të rritur, kryesisht femra. Të paktën pesë raste janë shtruar në spital.
- Farat/mikro-zarzatet e mbira identifikohen si burim i zakonshëm infeksioni në Irlandë, Finlandë dhe Mbretërinë e Bashkuar.
- Pesë vende të tjera kanë identifikuar izolate të lidhura ngushtë në raste nga e njëjta periudhë, ose kanë vërejtur një rritje të këtij serotipi, por pa informacione të mëtejshme mbi konsumin e ushqimit ose historinë e udhëtimeve