



INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

DEPARTAMENTI I EPIDEMIOLOGJISË DHE KONTROLLIT TË
SËMUNDJEVE INFEKTIVE

PROGRAMI KOMBËTAR I VAKSINIMIT

PROCESI I VAKSINIMIT NDAJ COVID-19 DHE GRIPIT SEZONAL

JAVA 48, 2025

Permbajtja:

1. VAKSINIMI NDAJ GRIPIT SEZONAL 2025-2026 (java 48, 2025)
2. VAKSINIMI NDAJ COVID-19 (Java 43, 2024-java 48, 2025)

1. VAKSINIMI NDAJ GRIPIT SEZONAL 2025-2026

Vaksinimi ndaj gripit sezonal është një masë parandaluese për të reduktuar shtrimet në spitale, komplikacionet dhe vdekjet e shkaktuara nga viruset respiratorë sidomos tek personat me semundje bashkëshoqeruese.

Programi Kombëtar i Vaksinimit, pranë Institutit të Shëndetit Publik (ISHP) ka shpërndarë në 36 Njësi Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH) **280,000 doza të vaksinës ndaj gripit sezonal**, përkatësisht:

- 40,000 doza në flakon një-dozësh
- 240,000 doza në flakon me 10 doza

Vaksinimi ndaj gripit sezonal për sezonin 2025–2026 nisi më **22 shtator 2025** në të gjithë vendin

Llojet e vaksinave të përdorura

- Gjatë këtij sezoni, në Shqipëri po aplikohen **vaksinat 4-valente** me virion te copëzuar, te inaktivizuara, GC FLU të prodhuara nga GC Biopharma në Korenë e Jugut dhe të parakualifikuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh) **të cilat janë në flakone** prej 0.5ml dhe aplikohen në mënyre intramuskulare.

Grupet prioritare:

Vaksinimi ndaj gripit rekomandohet për cdo person mbi 6 muaj por grupet prioritare në Shqipëri, me rrezik më të lartë janë si më poshtë:

- Punonjësit shëndetësorë (mjekë, infermierë, staf mbështetës)
- Personat dhe stafi i institucioneve të kujdesit afatgjatë
- Personat me sëmundje kronike (kardiovaskulare, pulmonare, diabet, astmë, sëmundje të mëlçisë ose veshkave si dhe semundje te gjakut etj.)
- Persona me kancer, limfoma etj,
- Persona obezë
- Personat me imunitet të kompromentuar si personat me HIV.
- Gra shtatzëna
- Persona mbi 65 vjeç

- Fëmijët mbi 6 muaj deri 12 vjec, sidomos ata me sëmundje bashkëshoqëruese.
- Mësuesët, edukatorët, policët dhe forcat e rendit.


Ecuria e vaksinimit:

Aplikimi dhe regjistrimi në SIV i vaksinave ndaj gripit sezonal filloi më **22 shtator 2025**.

- Deri në **javën 48-të/2025 (22 Shtator – 30 Nëntor)** janë kryer gjithsej **227 037 doza**, që përbëjnë **81.1 % të dozave të shpërndara**.
- NJVKSH-të me përdorim mbi 90% të vaksinave në të gjithë vendin janë **NJVKSH Skrapar (100 %), NJVKSH Gramsh (98.8 %), NJVKSH Fier (97.9 %), NJVKSH Mallakastër (97.1 %), NJVKSH Kukës (96.8 %), NJVKSH Kuçovë (96.7 %), NJVKSH Devoll (94.8 %), NJVKSH Korçë (93.2 %), NJVKSH Dibër (91.1 %), NJVKSH Mirditë (91.1 %) dhe NJVKSH Lezhë (90.1%)**.
- Grupmosha **mbi 80 vjeç** është me mbulesën më të lartë vaksinale (**30.2 %**).
- Personat mbi 60 vjeç kanë një mbulesë vaksinale (**23.4 %**) dhe kanë aplikuar në total **162 433** vaksina. NJVKSH-ja me numrin më të madh të aplikimeve të vaksinës tek personat mbi 60 vjeç është **NJVKSH Tiranë** me **21 487** vaksina.
- Në grupet e riskut personat me **sëmundje kardiovaskulare** kanë mbulesën më të lartë vaksinale (**37.2 %**).
- Personat diabetikë kanë një mbulesë vaksinale (**28 %**) dhe në total janë aplikuar **27 890** vaksina. NJVKSH-të me numrin më të madh të aplikimeve të vaksinës tek personat diabetikë janë **NJVKSH Tiranë** **3 644** vaksina.
- Mbulesa vaksinale e personelit shëndetësor është (**51 %**). Mjekë të vaksinuar janë 2 357, infermierë 9 468 dhe staf mbështetës janë vaksinuar 2 437. **NJVKSH-ja me numrin më të madh të aplikimeve të vaksinës tek personeli shëndetësor është NJVKSH Tiranë me 1 745 vaksina**.
- Mësuesit kanë përdorimin të mirë të vaksinës, **2 062** vaksina të aplikuar.

Vlen të theksohet që NJVKSH Tiranë ka mbulim më të mirë sepse ka numrin më të madh të popullsisë dhe personelit në çdo kategori.


Ecuria e vaksinimit ndaj gripit sezonal sipas javëve paraqitet në grafikun e mëposhtëm: Java 39 paraqet kulmin e vaksinimit me 74 450 doza, duke reflektuar fillimin e fushatës dhe interesin më të lartë nga grupet e riskut. Pas kësaj jave, nga java 40 deri në 48 vërehet një rënie graduale dhe e qëndrueshme javore të vaksinimeve, e cila përputhet me ritmin normal të fushatave sezonale: javët e para kanë fluks të lartë, ndërsa më pas volumi bie pasi pjesa më e madhe e personave që përfshihen në grupet e riskut janë vaksinuar. Në javën 48 vaksinimi vijon.



Grafiku 1: Ecuria e vaksinimit sipas javëve

Përdorimi vaksinës ndaj Gripit në nivel qarku shprehur në hartë, java 48. Harta paraqet përdorimin e vaksinës sipas 12 qarqeve, e cila varion ndjeshëm midis rajoneve. Përqindjet më të larta regjistrohen në Kukës (92.2 %), Berat (91.8 %), Korçë (90.1 %), Lezhë (87.1 %) Gjirokastër (81.4%) dhe Fier (85.8 %) që tregojnë për një qasje të fortë ndaj vaksinimit dhe një angazhim të mirë të strukturave shëndetësore dhe komunitetit.

Qarqet me përdorim më të ulët janë Elbasani (70 %), Shkodra (75.9%), Tirana (76.9%), Vlora (77.1 %), Dibra (78.3%) dhe Durrës (79.6%) dhe çka sugjeron nevojë për përf forcimin e fushatave informuese, mobilizimin e shërbimeve shëndetësore dhe adresimin e barrierave lokale (hezitimi dhe ndjekja aktive e grupeve të riskut).



Harta 1: Përdorimi i vaksinës ndaj Gripit në % sipas qarqeve


Shpërndarja e dozave të shpërndara dhe të aplikuar sipas 36 NJVKSH-ve paraqitet në tabelën e mëposhtme. Të dhënat tregojnë se shumica e NJVKSH-ve kanë një **përdorim të mirë** në aplikimin e vaksinës ndaj gripit sezonal.

	NJVKSH	Sasia ne doza	Sasia e shperndare (GC Flu 1/doze)	Sasia e aplikuar me (GC Flu 1/doze)	% e aplikimit (GC Flu 1/doze)	Sasia e shperndare (GC Flu 10/doze)	Sasia e aplikuar me (GC Flu 10/doze)	% e aplikimit (GC Flu 10/doze)	TOTAL	% e aplikimit ne total
Shkodër	Shkodër	14000	1000	704	70.4	13000	9398	72.29	10102	72.16
	Malësi e Madhe	3500	500	344	68.8	3000	2479	82.63	2823	80.66
	Pukë	2500	500	306	61.2	2000	1928	96.40	2234	89.36
Kukës	Kukës	4000	500	481	96.2	3500	3391	96.89	3872	96.80
	Has	1500	500	436	87.2	1000	917	91.70	1353	90.20
	Tropojë	2000	500	482	96.4	1500	1209	80.60	1691	84.55
Lezhë	Lezhë	6000	500	464	92.8	5500	4991	90.75	5455	90.92
	Mirditë	2500	500	427	85.4	2000	1850	92.50	2277	91.08
	Kurbín	4500	500	500	100.0	4000	3101	77.53	3601	80.02
Tiranë	Tiranë	36000	6000	4348	72.5	30000	23357	77.86	27705	76.96
	Kavajë	7000	1000	703	70.3	6000	4679	77.98	5382	76.89
Durrës	Durrës	17000	3000	2076	69.2	14000	11351	81.08	13427	78.98
	Krujë	6000	1000	551	55.1	5000	4318	86.36	4869	81.15
Dibër	Dibër	6000	1000	749	74.9	5000	4718	94.36	5467	91.12
	Bulqizë	3500	500	358	71.6	3000	1979	65.97	2337	66.77
	Mat	3800	800	450	56.3	3000	2163	72.10	2613	68.76
Fier	Fier	27600	2600	2373	91.3	25000	24651	98.60	27024	97.91
	Mallakastër	2900	400	400	100.0	2500	2415	96.60	2815	97.07
	Lushnjë	22000	2000	1580	79.0	20000	13633	68.17	15213	69.15
Vlorë	Vlorë	18500	1500	1427	95.1	17000	13471	79.24	14898	80.53
	Delvinë	3450	450	412	91.6	3000	1119	37.30	1531	44.38
	Sarandë	4800	800	673	84.1	4000	3521	88.03	4194	87.38
Gjirokastrë	Gjirokastrë	7500	1000	746	74.6	6500	5033	77.43	5779	77.05
	Përmet	3450	450	293	65.1	3000	2715	90.50	3008	87.19
	Tepelenë	3000	500	458	91.6	2500	2116	84.64	2574	85.80
Korçë	Korçë	11000	1000	899	89.9	10000	9355	93.55	10254	93.22
	Pogradec	6330	830	645	77.7	5500	4602	83.67	5247	82.89
	Devoll	2500	500	451	90.2	2000	1919	95.95	2370	94.80
	Kolonjë	1500	500	432	86.4	1000	921	92.10	1353	90.20
Berat	Berat	11000	1000	657	65.7	10000	8966	89.66	9623	87.48
	Kuçovë	3500	500	496	99.2	3000	2891	96.37	3387	96.77
	Skrapar	3500	500	500	100.0	3000	3000	100.00	3500	100.00
Elbasan	Elbasan	16000	4000	3311	82.8	12000	6720	56.00	10031	62.69
	Peqin	3000	500	333	66.6	2500	1845	73.80	2178	72.60
	Gramsh	3500	500	469	93.8	3000	2990	99.67	3459	98.83
	Librazhd	3500	500	306	61.2	3000	2221	74.03	2527	72.20
Total		278330	38330	30240		240000	195933		226173	81.26

Tabela 1: Sasia e dozave te shpërndara dhe përqindja e aplikimit sipas NJVKSH-ve, java 48


Ecuria e procesit te vaksinimit sipas katër rajoneve të vendit, java 48, 2025

DROSHKSH Tiranë: përfshin NJVKSH Bulqizë, Dibër, Mat, Durrës, Krujë, Tiranë dhe Kavajë. Në total janë aplikuar (7.9 %) e dozave të marra për këtë rajon ku NJVKSH-ja me përdorimin më të lartë është NJVKSH Dibër (91.1 %). Përdorimi i vaksinës në përqindje për këtë rajon paraqitet në grafikun e mëposhtëm.




Grafiku 2: Përqindja e aplikimit sipas NJVKSH-ve, DROSHKSH Tiranë

DROSHKSH Shkodër: përfshin NJVKSH Has, Kukës, Tropojë, Lezhë, Kurbin, Mirditë, Shkodër, Pukë dhe Malësi e Madhe. Në total janë aplikuar (82.4 %) e dozave të marra për këtë rajon ku NJVKSH-të me përdorimin më të lartë të vaksinës janë NJVKSH Kukës (96.8 %), NJVKSH Mirditë (91.1 %) NJVKSH Lezhë (90.9 %), dhe NJVKSH Has (90.2 %).




Grafiku 3: Përqindja e aplikimit sipas NJVKSH-ve, DROSHKSH Shkodër

DROSHKSH Elbasan: përfshin NJVKSH Korçë, Pogradec, Devoll, Kolonjë, Berat, Kuçovë, Skrapar, Elbasan, Peqin, Gramsh dhe Librazhd. Në total janë aplikuar (82.5 %) e dozave të marra për këtë rajon ku NJVKSH-të me përdorimin më të lartë të vaksinës janë NJVKSH Skrapar (100 %), NJVKSH Gramsh (98.8 %) dhe NJVKSH Kuçovë (96.8 %).



Grafiku 4: Përqindja e aplikimit sipas NJVKSH-ve, DROSHKSH Elbasan


DROSHKSH Vlorë: përfshin NJVKSH Fier, Lushnjë, Mallakastër, Gjirokastër, Përmet, Tepelenë, Delvinë, Sarandë dhe Vlorë. Në total janë aplikuar (82.6 %) e dozave të marra për këtë rajon ku NJVKSH-të me përdorimin më të lartë të vaksinës janë NJVKSH Fier (97.9 %) dhe NJVKSH Mallakastër (97.1 %).



Grafiku 5: Përqindja e aplikimit sipas NJVKSH-ve, DROSHKSH Vlorë

Mbulesa vaksinale sipas grup-moshave


Grafiku më poshtë paraqet mbulesën vaksinale sipas grupmoshave. Grupmosha me mbulesën më të lartë vaksinale është mbi 80 vjeç (30.2 %).



Grafiku 6: Mbulesa vaksinale ndaj gripit sezonal sipas grupmoshave, java 48, 2025


Aplikimi i vaksinës sipas grupeve të riskut

Grafiku paraqet administrimin e vaksinës tek personat me sëmundje kronike prioritare për tu vaksinuar ndaj gripit sezonal, ku ato me sëmundje kardiovaskulare kanë përdorimin më të lartë të saj.




Grafiku 7: Numri i vaksinave të aplikuara tek personat me sëmundje kronike, java 48, 2025


Administrimi i vaksinës sipas grupeve të riskut për të katër rajonet e vendit paraqitet në grafikët e mëposhtëm, java 48




Grafiku 8: Administrimi i vaksinës sipas grupeve të riskut, DROSHKSH Shkodër



Grafiku 9: Administrimi i vaksinës sipas grupeve të riskut, DROSHKSH Tiranë




Grafiku 10: Administrimi i vaksinës sipas grupeve të riskut, DROSHKSH Elbasan



Grafiku 11: Administrimi i vaksinës sipas grupeve të riskut, DROSHKSH Vlorë

Mbulesa vaksinale sipas grupeve të riskut


Grafiku paraqet mbulesën vaksinale sipas grupeve të riskut dhe mbulesa vaksinale më e lartë është tek personat me sëmundje kardiovaskulare. Të dhënat e popullatës me sëmundje kronike janë marrë nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (**FSDKSH**).



Grafiku 12: Mbulesa vaksinale sipas grupeve të riskut, java 48, 2025


Aplikimi i vaksinës tek personeli shëndetësor

Stafi mjekësor është ndër grupet më të ekspozuara ndaj gripit sezonal për shkak të kontaktit të vazhdueshëm me pacientët dhe ekspozimit të lartë ndaj infeksioneve respiratore. Në total në gjithë Shqipërinë në javën e 48-të/2025 janë vaksinuar 14,262 personel shëndetësor, me një mbulesë vaksinale **51 %**, ku infermierët përbëjnë grupin më të madh të vaksinuar me 9,468 vaksina.




Grafiku 13: Numri i vaksinave të aplikuara sipas personelit shëndetësor


Mbulesa vaksinale tek personeli shëndetësor në shërbimin parësor sipas katër rajoneve, java 48




Grafiku 14: Mbulesa vaksinale në shërbimin parësor sipas personelit shëndetësor, DROSHKSH Shkodër



Grafiku 15: Mbulesa vaksinale në shërbimin parësor sipas personelit shëndetësor, DROSHKSH Tiranë




Grafiku 16: Mbulesa vaksinale në shërbimin parësor sipas personelit shëndetësor, DROSHKSH Vlorë




Grafiku 17: Mbulesa vaksinale në shërbimin parësor sipas personelit shëndetësor, DROSHKSH Elbasan

Mbulesa vaksinale në spitalet e vendit paraqitet në grafikët e mëposhtëm (të dhënat e numrit të stafit shëndetësor në këto spitale janë marrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale):




Grafiku 18: Mbulesa vaksinale në spitalet e vendit



Grafiku 19: Mbulesa vaksinale në spitalet e vendit sipas personelit shëndetësor

Grupet në risk prioritare për tu vaksinuar lidhur me profesionet janë shprehur në grafikun e mëposhtëm dhe numri më i madh i vaksinave është aplikuar tek mësuesit.



Grafiku 20: Numri i aplikimit të vaksinave sipas profesioneve

1. VAKSINIMI NDAJ COVID-19 (Java 43, 2024-java 48, 2025)

Në mbledhjen e datës 22 gusht 2024, Komiteti Shqiptar i Ekspertëve të Vaksinimit (NITAG) rekomandoi:

1. Vaksinimi ndaj COVID-19 duhet të vazhdojë.
2. Çdo vit duhet të aplikohet vakcina ndaj COVID-19 për grupet më prioritare dhe në rrezik.
3. Vakcina COVID-19 duhet të administrohet në të njëjtën kohë me vaksinën kundër gripit sezonal, kur është e mundur, për të shmangur që qytetarët të paraqiten dy herë në qendrat shëndetësore.
4. Të vaksinohen me një dozë të vaksinës monovalente, pavarësisht nga statusi i mëparshëm i vaksinimit, personat në grupet e mëposhtme:
 - Punonjësit shëndetësorë dhe ata që punojnë në institucione të kujdesit afatgjatë.
 - Personat që jetojnë në institucione të kujdesit afatgjatë (mbi 12 vjeç).
 - Të gjithë personat mbi 60 vjeç.

- Personat mbi 12 vjeç me sëmundje bashkëshoqëruese, përfshirë:
 - Sëmundje kardiovaskulare.
 - Diabet.
 - Sëmundje obstruktive të mushkërive.
 - Sëmundje kronike të veshkave dhe mëlçisë.
 - Lloje të ndryshme kanceri.
 - Gjendje që shkaktojnë frenim të imunitetit.
 - Obezitet.
- Gratë shtatzëna.

Vaksina COMIRNATY™ e Disponueshme në Shqipëri:

Aktualisht në Shqipëri është e disponueshme vaksina **COMIRNATY™ Monovalent [Omicron JN.1]**

COMIRNATY™ Monovalent [Omicron JN.1]


- **Përmbajtje aktive:** *bretoveran* (mRNA për nënvariantin Omicron JN.1)
- **Përdorimi:** 30 mikrogramë për adoleshentë dhe të rritur ≥ 12 vjeç
- **Data e skadencës së dozave të ardhura:** 31 mars 2026
- **Sasia e ardhur më 17 prill 2025:** 5,760 doza

Dokumentimi i Vaksinimit

Çdo vaksinë e administruar regjistrohet **në kohë reale në Sistemin e Informimit të Vaksinimit (SIV)** dhe është e disponueshme për qytetarët në **portalin e-Albania**, te seksioni “**Kartela ime e Vaksinimit**”.


Kartela ofrohet në **shqip dhe anglisht** dhe është e vlefshme për përdorim personal apo zyrtar.

Nga fillimi i përdorimit në javën e 43-të të vitit 2024 deri në javën e 48-të të vitit 2025, në Shqipëri janë administruar gjithsej **1,646 doza**.



Grafiku 1. Numri i vaksinave ndaj COVID-19 të aplikuara sipas javeve, (java 43, 2024-java 48, 2025)


Grafiku paraqet numrin e vaksinave COVID-19 të aplikuara sipas javëve, për periudhën 2024–2025. Megjithëse rekomandohet aplikimi i vaksinës kundër COVID-19, vihet re një ulje e kërkesës nga qytetarët dhe, si pasojë, edhe e numrit të vaksinave të administruara.



Grafiku 2. Numri i vaksinave ndaj COVID-19 të aplikuara sipas NJVKSH-ve (java 43, 2024-java 48, 2025)

Sic shihet në grafik **Tirana** ka numrin më të lartë të vaksinave (509), ndjekur nga **Fieri** (191) dhe **Vlora** (142).


Stafi mjekësor përbën një nga grupet me risk të lartë për ekspozim ndaj infeksionit me COVID-19, për shkak të kontaktit të drejtpërdrejtë me pacientët dhe mjediset shëndetësore. Vaksinimi i këtij grupi është thelbësor jo vetëm për mbrojtjen e shëndetit të tyre personal, por edhe për të garantuar sigurinë e pacientëve dhe vazhdimësinë e shërbimeve shëndetësore. Megjithatë, të dhënat tregojnë se përdorimi i vaksinës në këtë kategori mbetet i ulët. Ne total janë aplikuar **79 doza** deri javen e 48, 2025.



Grafiku 3: Numri i stafit mjeksor te vaksinuar ndaj COVID-19, (java 43, 2024-java 48, 2025)

Infermierët kanë numrin më të madh të vaksinimeve (**46**), ndjekur nga **mjekët** me (**24**). **Stafi mbështetës** ka marrë **9 doza**. **Totali i përgjithshëm është 79**, duke reflektuar numrin e përgjithshëm të vaksinimeve në këtë kategori profesionale.


Grupet në rrezik për komplikacione të rënda nga COVID-19 përfshijnë të moshuarit, personat me sëmundje kronike (si diabet, hipertension, sëmundje kardiovaskulare, respiratore, renale dhe hepatike), individët me imunitet të kompromentuar, gratë shtatzëna, si dhe punonjësit shëndetësorë. Vaksinimi i këtyre grupeve është një masë thelbësore parandaluese për të reduktuar shtrimet në spitale, format e rënda të sëmundjes dhe rrezikun e vdekshmërisë. Për më tepër, mbrojtja e këtyre kategorive ka ndikim të drejtpërdrejtë në ruajtjen e kapaciteteve të sistemit shëndetësor dhe në sigurimin e funksionimit normal të shërbimeve të tjera mjekësore. Rekomandimet ndërkombëtare dhe ato kombëtare theksojnë rëndësinë e vaksinimit periodik për këto grupe, duke pasur parasysh se imuniteti i fituar nga vaksina apo infeksioni i mëparshëm zbehet me kalimin e kohës.



Grafiku 1: Numri I personave te vaksinuar ndaj COVID-19 sipas grupeve te riskut, (java 43, 2024-java 48, 2025)

Vaksinimi ndaj COVID-19 sipas grupmoshave

Vaksinimi kundër COVID-19 mbetet një ndër masat kryesore për parandalimin e formave të rënda të sëmundjes dhe uljen e numrit të shtrimeve në spitale. Efektiviteti dhe rëndësia e vaksinimit ndryshon sipas grupmoshave, duke reflektuar nivelin e rrezikut që secila kategori paraqet. Grupmosha **25–39 vjeç** ka numrin më të lartë të vaksinimeve (463 raste). Pas saj renditen grupmoshat **50–59 vjeç (317 raste)** dhe **60–69 vjeç (306 raste)**. Grupmoshat më të reja (12–17 vjeç) dhe më të moshuarit mbi 80 vjeç kanë numrat më të ulët të vaksinimit.



Grafiku 2: Numri i vaksinave ndaj COVID-19 te aplikuara sipas grup-moshave, (java 43, 2024-java 48, 2025)

INSTITUTI I
SHËNDETIT PUBLIK